

Constance.



**Mažmeninė
prekyba**
Šviežiam
vartojimui



**Tradicinis
segmentas**
Tradicinis

Image:

characteristics

Pagrindinės savybės

Veisėjas: J.L. Spijkman

Kryžminimas: MARABEL x AR 93-1243

Veisėjo teisės: 31-12-2044

Daigas iš bulvių sėklos: SA 02-0020

Augalo ir gumbų savybės

Branda: vidutinio ankstyvumo / 7

Šviesi daigelio spalva: mėlynai violetinė / BV

Žiedo spalva: balta / W

Uogų skaičius: vidutinis / 6

Lapų pradinis išsivystymas: gana spartus / 7

Lapų galutinis išsivystymas: geras / 8

Lapų tvirtumas: gana tvirta / 7

Lapijos jautrumas arba atsparumas selektyviam poveikiui: vidutiniškas / 6,5

Odelės spalva: geltona / Y

Minkštimo spalva: šviesiai geltona / 6,5

Bulvių odelės kokybė: puiki / 8

Gumbų forma: ovaliai apvali / OR

Gumbo formos reguliavimas: taisiklinga / 7

Bulvių gumbų formavimasis: vidutinis / 6

Gumbų dydis: gana didelė / 7

Dydžio reguliavimas: taisiklinga / 7

Ramybės periodas: vidutinis / 6,5

Jautrumas ir kokybė

Pakartotinis gumbų augimas: šiek tiek jautrus / 7

Juoda dėmė (vidinė mėlynė): šiek tiek arba visai nejautrus / 8

Gumbų įtrūkimai dėl augimo: šiek tiek jautrus / 7

Pažeidimai nuimant derlių: labai jautrus / 4,5

Metribuzino naudojimas prieš sudygimą: šiek tiek jautrus / 7

Metribuzino naudojimas po sudygimo: šiek tiek jautrus / 7,5

Bentazonas: šiek tiek arba visai nejautrus / 8

Augalų hormonas etilenas: 15 % - 25 % daugiau gumbų / 7

Sausųjų medžiagų kiekis: 358

Sausųjų medžiagų kiekis: 19,7%

Gaminimo būdas: išvirusių forma išlieka, šiek tiek sukrenta / AB

Spalvos pokytis po virimo: gana jautrus / 6,5

Spalvos pokytis po skutimo: gana jautrus / 6,5

Kepimo kokybė: žemiau vidutinės / 5,5

Sausųjų medžiagų pasiskirstymas: - / -

Traškumo kokybė: netinkamas / 4

Bendras glikozidų lygis/TGA kiekis: 4,3

Karvono aliejus: 5 % - 15 % daugiau gumbų / 6

S_Dormancy: vidutinis / 6,5



How to grow

Tręšimas ir sėklų apdorojimas ¹

Azotas: standartinė tręšimo norma + 15% trąšų.

Fosforas: standartinė tręšimo norma.

Kalis: standartinė tręšimo norma + 15% trąšų.

Sėklos paruošimas sodinimui

Teisingai sudaiginti gumbai išaugina gausesnį derlių. Aplaužius daigus daugiau kaip vieną kartą sumažėja derlius ir gumbų dydis.

Planting distance

28/35 mm: 27 cm (50.000 plants/ha)

35/55 mm: 36 cm (37.000 plants/ha)

Piktžolės

Standartinis metribuzino (Sencor) naudojimas prieš arba po daigų sudygimo gali sukelti tam tikrą lapijos reakciją, tačiau derlius retai sumažėja.

Pasėlių priežiūra

Būtinai griežtas prevencinis purškimas nuo maro.

Derliaus nuėmimas

Nupjovus bulvienoju mechaniniams pažeidimams jautrių veislių bulves kasti ne anksčiau kaip po 3 savaičių.

Laikymo temperatūra - laikymo terminas

Rekomenduotina sandėliavimo temperatūra yra 5 °C. Veislė tinkama sandėliuoti iki kovo mėnesio ir ilgiau.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Atsparumas

Lapų susiraitymo virusinė liga: - / -

Virusas - Yn: Šiek tiek arba visai nejautrus / 8

Virusas - Yntn (Gumbo): Šiek tiek jautrus / 6,5

Purškimas: Šiek tiek jautrus / 6

Vėlyvojo pūvio pažeista lapija: Jautrus / 5

Vėlyvojo pūvio pažeisti gumbai: Labai jautrus / 4,5

Fuzariozė - sausasis puvinys: Šiek tiek jautrus / 6,5

Įprastoji rauplė: Šiek tiek jautrus / 6

Miltinė rauplė: Labai jautrus / 3

Virusas A: - / -

Virusas - X: Šiek tiek jautrus / 7

Juodoji dėmė: Šiek tiek jautrus / 7

Ervinija - minkštasis puvinys: Šiek tiek jautrus / 6

Rauplės F1: - / -

Rauplės F6: - / -

Rauplės F18: - / -

Auksinis nematodas Ro 1/4: - / -

Auksinis nematodas Ro 2/3: - / -

Baltasis bulvių nematodas Pa 2: - / -

Baltasis bulvių nematodas Pa 3: - / -