

Esmee.

Vidutiniškai ankstyva veislė. Itin graži raudona odelė, puikus pakantumas karščiui bei aukštas derliaus potencialas.



**Mažmeninė
prekyba**
Šviežiam
vartojimui



**Tradicinis
segmentas**
Tradicinis

- ▶ **Graži išvaizda**
- ▶ **Dideli gumbai**
- ▶ **Veislė atspari daugeliui virusų**

Image:

characteristics

Pagrindinės savybės

Veisėjas: Agrico Research B.V.
Kryžminimas: LAURA x RODEO
Veisėjo teisės: 31-12-2043
Daigas iš bulvių sėklos: AR 01-0410

Augalo ir gumbų savybės

Branda: vidutinio ankstyvumo / 6,5
Šviesi daigelio spalva: raudonai violetinė / RV
Žiedo spalva: šviesiai violetinė / LP
Uogų skaičius: labai aukštas / 4
Lapų pradinis išsivystymas: gana spartus / 7
Lapų galutinis išsivystymas: gana geras / 7,5
Lapų tvirtumas: gana tvirta / 7
Lapijos jautrumas arba atsparumas selektyviam poveikiui: gana lengvas / 7
Odelės spalva: raudona / R
Minkštimo spalva: geltona / 7
Bulvių odelės kokybė: puiki / 8
Gumbų forma: ovaliai pailga / OL
Gumbo formos reguliavimas: gana taisyklinga / 6,5
Bulvių gumbų formavimasis: vidutinis / 6
Gumbų dydis: didelė / 8
Dydžio reguliavimas: taisyklinga / 7
Ramybės periodas: vidutinis / 6

Jautrumas ir kokybė

Pakartotinis gumbų augimas: gana jautrus / 6,5
Juoda dėmė (vidinė mėlynė): šiek tiek arba visai nejautrus / 8
Gumbų įtrūkimai dėl augimo: gana jautrus / 6
Pažeidimai nuimant derlių: gana jautrus / 6,5
Metribuzino naudojimas prieš sudygimą: labai jautrus / 4
Metribuzino naudojimas po sudygimo: šiek tiek jautrus / 7
Bentazonas: šiek tiek jautrus / 7
Augalų hormonas etilenas: 5 % mažiau arba 5 % daugiau gumbų / 5
Sausųjų medžiagų kiekis: 326
Sausųjų medžiagų kiekis: 18%
Gaminimo būdas: išvirusių forma išlieka, šiek tiek sukrenta / AB
Spalvos pokytis po virimo: jautrus / 5,5
Spalvos pokytis po skutimo: gana jautrus / 6
Kepimo kokybė: vidutinė / 6
Sausųjų medžiagų pasiskirstymas: - / -
Traškumo kokybė: netinkamas / 4
Bendras glikozidų lygis/TGA kiekis: 8,2
Karvono aliejus: 15 % - 25 % daugiau gumbų / 7
S_Dormancy: vidutinis / 6

How to grow



Tręšimas ir sėklų apdorojimas ¹

Azotas: standartinė tręšimo norma + 10% trąšų.

Fosforas: standartinė tręšimo norma.

Kalis: standartinė tręšimo norma.

Sėklos paruošimas sodinimui

Tinka sodinti ir nedaigintus gumbus. Rekomenduotina sodinti nedaigintus gumbus.

Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54.000 augalai/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 augalai/ha)

Piktžolės

Nenaudokite metribuzino (Sencor), nes jis sukelia stiprią lapijos reakciją ir ženkliai sumažina derlių.

Pasėlių priežiūra

Būtinai griežtas prevencinis purškimas nuo maro.

Derliaus nuėmimas

Nupjovus bulvienoju mechaniniams pažeidimams jautrių veislių bulves kasti ne anksčiau kaip po 3 savaičių.

Laikymo temperatūra - laikymo terminas

Rekomenduotina sandėliavimo temperatūra yra 5 °C. Veislė tinkama sandėliuoti iki kovo mėnesio ir ilgiau.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Atsparumas

Lapų susiraitymo virusinė liga: - / -

Virusas - Yn: Šiek tiek arba visai nejautrus / 8

Virusas - Yntn (Gumbo): Šiek tiek jautrus / 7

Purškimas: Labai jautrus / 4

Vėlyvojo pūvio pažeista lapija: Labai jautrus / 4,5

Vėlyvojo pūvio pažeisti gumbai: Šiek tiek jautrus / 7

Fuzariozė - sausasis puvinys: Šiek tiek jautrus / 7

Įprastoji rauplė: Šiek tiek jautrus / 6

Miltinė rauplė: Šiek tiek jautrus / 6,5

Virusas A: - / -

Virusas - X: Šiek tiek arba visai nejautrus / 8

Juodoji dėmė: Jautrus / 5,5

Ervinija - minkštasis puvinys: Šiek tiek jautrus / 7

Rauplės F1: atspari / 10

Rauplės F6: - / -

Rauplės F18: - / -

Auksinis nematodas Ro 1/4: - / -

Auksinis nematodas Ro 2/3: - / -

Baltasis bulvių nematodas Pa 2: - / -

Baltasis bulvių nematodas Pa 3: - / -