CULTIVATION **RECOMMENDATION**

Ranomi.

Mažmeninė prekyba
Šviežiam vartojimui

Tradicinis segmentas
Tradicinis

Image:

Savybės

Pagrindinės savybės

Veisėjas: Agrico Research B.V.

Kryžminimas: AR 93-033-79 x AR 95-0319

Veisėjo teisės: 31-12-2044

Daigas iš bulvių sėklos: AR 03-0221

Augalo ir gumbų savybės

Branda: ankstyva / 7,5

Šviesi daigelio spalva: raudonai violetinė / RV

Žiedo spalva: balta / W

Uogų skaičius: vidutinis / 6

Lapų pradinis išsivystymas: gana spartus / 7,5

Lapų galutinis išsivystymas: vidutinis / 7

Lapų tvirtumas: vidutinė / 6,5

Lapijos jautrumas arba atsparumas selektyviam poveikiui: vidutiniškas / 6

Odelės spalva: geltona / Y

Minkštimo spalva: šviesiai geltona / 6,5

Bulvių odelės kokybė: gera / 7

Gumbų forma: ovaliai pailga / OL

Gumbo formos reguliavimas: taisiklinga / 7

Bulvių gumbų formavimasis: vidutinis / 6

Gumbų dydis: gana didelė / 7

Dydžio reguliavimas: taisiklinga / 7

Ramybės periodas: vidutinis / 6

Jautrumas ir kokybė

Pakartotinis gumbų augimas: gana jautrus / 6

Juoda dėmė (vidinė mėlynė): šiek tiek arba visai nejautrus / 8

Gumbų įtrūkimai dėl augimo: gana jautrus / 6,5

Pažeidimai nuimant derlių: gana jautrus / 6

Metribuzino naudojimas prieš sudygimą: jautrus / 5

Metribuzino naudojimas po sudygimo: gana jautrus / 6

Bentazonas: šiek tiek jautrus / 7

Augalų hormonas etilenas: 5 % - 15 % daugiau gumbų / 6

Sausųjų medžiagų kiekis: 322

Sausųjų medžiagų kiekis: 17,9%

Gaminimo būdas: išvirusių forma išlieka, šiek tiek sukrenta / AB

Spalvos pokytis po virimo: gana jautrus / 6

Spalvos pokytis po skutimo: - / -

Kepimo kokybė: aukščiau vidutinės / 6,5

Sausųjų medžiagų pasiskirstymas: - / -

Traškumo kokybė: netinkamas / 5

Bendras glikozidų lygis/TGA kiekis: 4,08

Karvono aliejus: 15 % - 25 % daugiau gumbų / 7

S_Dormancy: vidutinis / 6

Agrico has taken all reasonable care in producing this variety description. However, please note that any information may be subject to change and Agrico accepts no responsibility for errors or omissions. In no event shall Agrico be liable for damages arising out of or related to the information contained within this description.

AGRICO

CULTIVATION RECOMMENDATION

Auginimo rekomendacijos

Tręšimas ir sėklų apdorojimas [1]

Azotas: standartinė tręšimo norma.Tręšti per du kartus: pagrindinį (prieš sodinimą) ir papildomą tręšimą (gumbų formavimos laikotarpiu).

Fosforas: standartinė tręšimo norma.

Kalis: standartinė tręšimo norma + 10% trąšų.

Sėklos paruošimas sodinimui

Tinka sodinti ir nedaigintus gumbus.Aplaužius daigus daugiau kaip vieną kartą sumažėja derlius ir gumbų dydis.

Sodinimo atstumas

28/35 mm: 25 cm (54.000 plants/ha)
35/55 mm: 30 cm (45.000 plants/ha)

Piktžolės

Standartinis metribuzino (Sencor) naudojimas prieš arba po daigų sudygimo gali sukelti tam tikrą lapijos reakciją ir šiek tiek sumažinti derlių.

Pasėlių priežiūra

Būtinas griežtas prevencinis purškimas nuo maro.

Derliaus nuėmimas

Nupjovus bulvienojų derlių imti po dviejų savaičių.

Laikymo temperatūra - laikymo terminas

Rekomenduotina sandėliavimo temperatūra yra 4 ºC. Veislė tinkama trumpai sandėliuoti.

Image:

Say potato, say Agrico.

Atsparumas

Lapų susiraitymo virusinė liga: - / -
Virusas - Yn: Jautrus / 5,5
Virusas - Yntn (Gumbo): Šiek tiek jautrus / 6
Purškimas: Šiek tiek jautrus / 6,5
Vėlyvojo pūvio pažeista lapija: Labai jautrus / 4
Vėlyvojo pūvio pažeisti gumbai: Šiek tiek jautrus / 6
Fuzariozė - sausasis puvinys: Jautrus / 5
Įprastoji rauplė: Šiek tiek jautrus / 6,5
Miltinė rauplė: Labai jautrus / 4,5
Virusas A: - / -
Virusas - X: Jautrus / 5,5
Juodoji dėmė: Šiek tiek jautrus / 7
Ervinija - minkštasis puvinys: - / -
Rauplės F1: atspari / 10
Rauplės F6: - / -
Rauplės F18: - / -
Auksinis nematodas Ro 1/4: Atsparus / 9
Auksinis nematodas Ro 2/3: - / -
Baltasis bulvių nematodas Pa 2: - / -
Baltasis bulvių nematodas Pa 3: - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord • The Netherlands +31 (0)527 63 99 11 info@agrico.nl agricopotatoes.com