

Twister.

Vidutiniškai ankstyva veislė, tinkama auginti ekologiškai. Atspari lapų ir gumbų marui. Aukštas derlingumo potencialas.



**Ekologiniam
auginimui**
Ekologinis
auginimas



**Mažmeninė
prekyba**
Šviežiam
vartojimui



**Tradicinis
segmentas**
Tradicinis

Image:

- ▶ **Puiki išvaizda**
- ▶ **Gerai laikosi sandėlyje**
- ▶ **Išvirusių forma išlieka, šiek tiek sukrenta**

characteristics

Pagrindinės savybės

Veisėjas: G.W. te Winkel
Kryžminimas: ARG 96-0739 x AR 02-9113
Veisėjo teisės: 31-12-2048
Daigas iš bulvių sėklos: TW 08-1507

Augalo ir gumbų savybės

Branda: vidutinio ankstyvumo / 7
Šviesi daigelio spalva: raudonai violetinė / RV
Žiedo spalva: šviesiai violetinė / LP
Uogų skaičius: aukščiau vidurkio / 5,5
Lapų pradinis išsivystymas: gana spartus / 7
Lapų galutinis išsivystymas: gana geras / 7,5
Lapų tvirtumas: gana tvirta / 7
Lapijos jautrumas arba atsparumas selektyviam poveikiui: vidutiniškas / 6,5
Odelės spalva: geltona / Y
Minkštimo spalva: šviesiai geltona / 6,5
Bulvių odelės kokybė: gera / 7
Gumbų forma: apvaliai ovali / RO
Gumbo formos reguliavimas: taisiklinga / 7
Bulvių gumbų formavimasis: vidutinis / 6,5
Gumbų dydis: gana didelė / 7
Dydžio reguliavimas: gana taisyklinga / 6,5
Ramybės periodas: gana ilgas / 7

Jautrumas ir kokybė

Pakartotinis gumbų augimas: gana jautrus / 6,5
Juoda dėmė (vidinė mėlynė): šiek tiek arba visai nejautrus / 8
Gumbų įtrūkimai dėl augimo: gana jautrus / 6,5
Pažeidimai nuimant derlių: šiek tiek jautrus / 7
Metribuzino naudojimas prieš sudygimą: labai jautrus / 3
Metribuzino naudojimas po sudygimo: labai jautrus / 3
Bentazonas: gana jautrus / 6
Augalų hormonas etilenas: 5 % mažiau gumbų / 4
Sausųjų medžiagų kiekis: 345
Sausųjų medžiagų kiekis: 19%
Gaminimo būdas: išvirusių forma išlieka, šiek tiek sukrenta / AB
Spalvos pokytis po virimo: gana jautrus / 6,5
Spalvos pokytis po skutimo: gana jautrus / 6
Kepimo kokybė: netinkamas / 5
Sausųjų medžiagų pasiskirstymas: - / -
Traškumo kokybė: netinkamas / 4
Bendras glikozidų lygis/TGA kiekis: 5,63
Karvono aliejus: 15 % - 25 % daugiau gumbų / 7
S_Dormancy: gana ilgas / 7

How to grow



Tręšimas ir sėklų apdorojimas ¹

Azotas: standartinė tręšimo norma + 20% trąšų.

Fosforas: standartinė tręšimo norma.

Kalis: standartinė tręšimo norma.

Sėklos paruošimas sodinimui

Tinka sodinti ir nedaigintus gumbus. Gumbų daigus prieš sodinimą leistina aplaužyti tik vieną kartą.

Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.500 augalai/ha)

35/50 mm: 25 cm (54.000 augalai/ha)

Piktžolės

Nenaudokite metribuzino (Sencor), nes jis sukelia stiprią lapijos reakciją ir ženkliai sumažina derlių.

Pasėlių priežiūra

Rekomenduotinas profilaktinis purškimas nuo maro.

Derliaus nuėmimas

Nupjovus bulvienoju derlių imti po dviejų savaičių.

Laikymo temperatūra - laikymo terminas

Rekomenduotina sandėliavimo temperatūra yra 6 °C. Veislė tinkama sandėliuoti iki balandžio mėnesio ir ilgiau.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Atsparumas

Lapų susiraitymo virusinė liga: - / -

Virusas - Yn: Šiek tiek arba visai nejautrus / 8

Virusas - Yntn (Gumbo): Šiek tiek arba visai nejautrus / 8

Purškimas: Šiek tiek jautrus / 6

Vėlyvojo pūvio pažeista lapija: Šiek tiek arba visai nejautrus / 9

Vėlyvojo pūvio pažeisti gumbai: Šiek tiek arba visai nejautrus / 9

Fuzariozė - sausasis puvinys: Šiek tiek jautrus / 6

Įprastoji rauplė: Šiek tiek jautrus / 6

Miltinė rauplė: Jautrus / 5

Virusas A: - / -

Virusas - X: - / -

Juodoji dėmė: Šiek tiek jautrus / 7

Ervinija - minkštasis puvinys: - / -

Rauplės F1: vidutiniškai jautri / 8

Rauplės F6: - / -

Rauplės F18: - / -

Auksinis nematodas Ro 1/4: Atsparus / 9

Auksinis nematodas Ro 2/3: - / -

Baltasis bulvių nematodas Pa 2: - / -

Baltasis bulvių nematodas Pa 3: - / -