

Riviera.

Ankstyviausios maistinės bulvės. Geras atsparumas virusams, puikus pakantumas karščiui. Labai derlingos. Gumbai stambūs, vienodo didumo, tvirta odele.



Tradicinis
segmentas
Tradicinis

Image:

- ▶ **Dideli gumbai**
- ▶ **Graži išvaizda**
- ▶ **Geras atsparumas virusams**

characteristics

Pagrindinės savybės

Veisėjas: Mts. Boerhave
Kryžminimas: MINERVA x ALCMARIA
Veisėjo teisės: 31-12-2030
Daigas iš bulvių sėklos: BH 86-0266

Augalo ir gumbų savybės

Branda: labai ankstyva / 8
Šviesi daigelio spalva: mėlynai violetinė / BV
Žiedo spalva: balta / W
Uogų skaičius: labai aukštas / 4
Lapų pradinis išsivystymas: gana spartus / 7
Lapų galutinis išsivystymas: vidutinis / 7
Lapų tvirtumas: vidutinė / 6,5
Lapijos jautrumas arba atsparumas selektyviam poveikiui: vidutiniškas / 6,5
Odelės spalva: geltona / Y
Minkštimo spalva: šviesiai geltona / 6
Bulvių odelės kokybė: puiki / 8
Gumbų forma: ovaliai apvali / OR
Gumbo formos reguliavimas: gana taisyklinga / 6
Bulvių gumbų formavimasis: gana mažas / 5
Gumbų dydis: gana didelė / 7,5
Dydžio reguliavimas: taisyklinga / 7
Ramybės periodas: vidutinis / 6

Jautrumas ir kokybė

Pakartotinis gumbų augimas: gana jautrus / 6,5
Juoda dėmė (vidinė mėlynė): šiek tiek arba visai nejautrus / 8
Gumbų įtrūkimai dėl augimo: gana jautrus / 6,5
Pažeidimai nuimant derlių: gana jautrus / 6
Metribuzino naudojimas prieš sudygimą: šiek tiek arba visai nejautrus / 8
Metribuzino naudojimas po sudygimo: šiek tiek arba visai nejautrus / 8
Bentazonas: - / -
Augalų hormonas etilenas: 5 % - 15 % daugiau gumbų / 6
Sausųjų medžiagų kiekis: 318
Sausųjų medžiagų kiekis: 17,7%
Gaminimo būdas: išvirusių forma išlieka, šiek tiek sukrenta / AB
Spalvos pokytis po virimo: jautrus / 5,5
Spalvos pokytis po skutimo: - / -
Kepimo kokybė: netinkamas / 4,5
Sausųjų medžiagų pasiskirstymas: - / -
Traškumo kokybė: netinkamas / 4
Bendras glikozidų lygis/TGA kiekis: 4,8
Karvono aliejus: 5 % mažiau gumbų / 4
S_Dormancy: vidutinis / 6



How to grow

Tręšimas ir sėklų apdorojimas ¹

Azotas: standartinė tręšimo norma + 10% trąšų.

Fosforas: standartinė tręšimo norma.

Kalis: standartinė tręšimo norma.

Sėklos paruošimas sodinimui

Teisingai sudaiginti gumbai išaugina gausesnį derlių. Aplaužius daigus daugiau kaip vieną kartą sumažėja derlius ir gumbų dydis.

Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.500 augalai/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 augalai/ha)

Piktžolės

Standartinis metribuzino (Sencor) naudojimas prieš arba po daigų sudygimo neįtakoja lapijos ar derliaus sumažėjimo.

Pasėlių priežiūra

Būtinai griežtas prevencinis purškimas nuo maro.

Derliaus nuėmimas

Nupjovus bulvienoju derlių imti po dviejų savaičių.

Laikymo temperatūra - laikymo terminas

Rekomenduotina sandėliavimo temperatūra yra 4 °C. Veislė tinkama trumpai sandėliuoti.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Atsparumas

Lapų susiraitymo virusinė liga: Šiek tiek jautrus / 7

Virusas - Yn: Šiek tiek arba visai nejautrus / 8

Virusas - Yntn (Gumbo): Šiek tiek jautrus / 7

Purškimas: Labai jautrus / 4

Vėlyvojo pūvio pažeista lapija: Labai jautrus / 3

Vėlyvojo pūvio pažeisti gumbai: Jautrus / 5

Fuzariozė - sausasis puvinys: Šiek tiek jautrus / 6

Įprastoji rauplė: Jautrus / 5,5

Miltinė rauplė: Labai jautrus / 2

Virusas A: - / -

Virusas - X: - / -

Juodoji dėmė: Jautrus / 5,5

Ervinija - minkštasis puvinys: Jautrus / 5

Rauplės F1: atspari / 10

Rauplės F6: - / -

Rauplės F18: - / -

Auksinis nematodas Ro 1/4: Atsparus / 9

Auksinis nematodas Ro 2/3: - / -

Baltasis bulvių nematodas Pa 2: - / -

Baltasis bulvių nematodas Pa 3: - / -