

Chester (AR 13-2694).



**Verwerkende
industrie**
Chips
Vlokken

Een middenvroeg aardappelras voor chips met G. pallida-resistentie, zeer regelmatige sortering, goed onderwatergewicht en weinig gevoelig voor stootblauw.

- ▶ **Goede opbrengst en goed knolaantal**
- ▶ **Goede bakkleur, ook na lange bewaring**
- ▶ **Geschikt voor verwerking tot vlokken**



characteristics

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: AR 07-4052 x ALICANTE
Zaailing: AR 13-2694

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 6
Kiemkleur: - / -
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: - / -
Loof - ontwikkeling begin: snel / 8
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: matig / 5
Knolvorm: ovaal rond / OR
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting: gemiddeld / 6,5
Knolgrootte: vrij grof / 7
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: vrij kort / 5

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7,5
Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
Roibeschatiging: gevoelig / 5
Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6
Talent: 5% tot 15% meer knollen / 6
Onderwatergewicht: 446
Drogestofgehalte: 24%
Kooktype: kruimig / C
Gruuwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7
Rauwverkleuring: zeer gevoelig / 4,5
Frietkwaliteit: - / -
Drogestofverdeling: gemiddeld / 6
Chipskwaliteit: goed / 7
TGA-gehalte: 10,9

How to grow



www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies.
Fosfaat: standaard advies.
Kalium: standaard advies + 10%.

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Planting distance

30/40 mm: 25-27 cm (51.000 planten/ha)
40/50 mm: 30-32 cm (43.000 planten/ha)
50/60 mm: 35 cm (38.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) vóór en na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 9 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -
Virus - Yn: weinig vatbaar / 6
Virus - Yntn (knol): weinig tot niet vatbaar / 8
Kringrigheid: vatbaar / 5
Phytophthora loof: vatbaar / 5
Phytophthora knol: vatbaar / 5,5
Fusarium: vatbaar / 5
Schurft: vatbaar / 5,5

Poederschurft: - / -
Zwarte spikkel: - / -
Wratziekte F1 (D1): resistent / 10
Wratziekte F6 (O1): - / -
Wratziekte F18 (T1): - / -
Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): weinig vatbaar* / 5*
Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): weinig vatbaar / 5
Aardappelmoetheid Pa 2 (D): partieel resistent* / 7*
Aardappelmoetheid Pa 3 (E): partieel resistent / 8