

# Sivas (KO 13-2242).



Traditioneel

Een middenlaat aardappelras voor consumptie met grove, ovale knollen, goede kiemrust en zeer weinig gevoelig voor stootblauw.

- ▶ **Hoge opbrengst**
- ▶ **Goede virus- en schurftresistentie**
- ▶ **Goede schilhoedanigheid**



## characteristics

### Algemene kenmerken

Kweker: Konst Research B.V.  
 Kruising: KO 06-1457 x SAVANNA  
 Kwekersrecht: Aangevraagd  
 Zaailing: KO 13-2242

### Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 5,5  
 Kiemkleur: - / -  
 Bloemkleur: wit / W  
 Hoeveelheid bessen: gemiddeld / 6  
 Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5  
 Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8  
 Loof - stevigheid plant: stevig / 8  
 Schilkleur: geel / Y  
 Vleeskleur: lichtgeel / 6  
 Schilhoedanigheid: bovengemiddeld / 6,5  
 Knolvorm: ovaal / O  
 Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5  
 Knolzetting: vrij laag / 5,5  
 Knolgrootte: grof / 8  
 Regelmaat sortering: regelmatig / 7  
 Kiemrust: vrij lang / 7,5

### Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5  
 Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8  
 Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5  
 Rooibeschatting: redelijk gevoelig / 6,5  
 Ethyleen: 15% tot 25% meer knollen / 7  
 Talent: 25% meer knollen / 8  
 Onderwatergewicht: 350  
 Drogestofgehalte: 19,2%  
 Kooktype: vastkokend / A  
 Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6  
 Rauwverkleuring: - / -  
 Frietkwaliteit: gemiddeld / 6  
 Drogestofverdeling: - / -  
 Chipskwaliteit: - / -  
 TGA-gehalte: 7,4

# How to grow



[www.agricopotatoes.nl](http://www.agricopotatoes.nl)

## Teeltadvies <sup>1</sup>

**Stikstof:** standaard advies - 10%. Bij voorkeur een gedeelde gift en de tweede gift kort na knolzetting.

**Fosfaat:** standaard advies.

**Kalium:** standaard advies.

## Pootgoedbehandeling

Meer dan twee keer afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

## Planting distance

28/35 mm: 23 cm (58.000 plants/ha)

35/55 mm: 31 cm (42.000 plants/ha)

## Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) vóór en na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema wordt geadviseerd.

## Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

## Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse

Say potato,  
say Agrico.



## Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: weinig vatbaar / 6,5

Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7

Kringerigheid: - / -

Phytophthora loof: vatbaar / 5,5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Schurft: weinig vatbaar / 6,5

Poederschurft: - / -

Zwarte spikkel: - / -

Wrastziekte F1 (D1): resistent / 10

Wrastziekte F6 (O1): - / -

Wrastziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -