

Sivas (KO 13-2242).



Traditioneel

Een middenlaat consumptieras met grove, ovale knollen, goede kiemrust en zeer weinig gevoelig voor stootblauw.

- ▶ **Hoge opbrengst**
- ▶ **Goede virus- en schurftresistentie**
- ▶ **Goede schilhoedanigheid**

Afbeelding nog niet beschikbaar



characteristics

Algemene kenmerken

Kweker: Konst Research B.V.
 Kruising: KO 06-1457 x SAVANNA
 Kwekersrecht: Aangevraagd
 Zaailing: KO 13-2242

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 5,5
 Kiemkleur: - / -
 Bloemkleur: wit / W
 Hoeveelheid bessen: gemiddeld / 6
 Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
 Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
 Loof - stevigheid plant: stevig / 8
 Schilkleur: geel / Y
 Vleeskleur: lichtgeel / 6
 Schilhoedanigheid: bovengemiddeld / 6,5
 Knolvorm: ovaal / O
 Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
 Knolzetting: vrij laag / 5,5
 Knolgrootte: grof / 8
 Regelmaat sortering: regelmatig / 7
 Kiemrust: vrij lang / 7,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
 Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
 Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
 Rooibeschatting: - / -
 Metribuzin - vóór opkomst: - / -
 Metribuzin - ná opkomst: - / -
 Bentazon: - / -
 Ethyleen: - / -
 Onderwatergewicht: 350
 Drogestofgehalte: 19,2%
 Kooktype: vastkokend / A
 Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6
 Rauwverkleuring: - / -
 Frietkwaliteit: gemiddeld / 6
 Drogestofverdeling: - / -
 Chipskwaliteit: - / -
 TGA-gehalte: 7.4

How to grow



www.agricopotatoes.com

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies - 10%. Bij voorkeur een gedeelde gift en de tweede gift kort na knolzetting.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling

Meer dan twee keer afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Planting distance

28/35 mm: 23 cm (58.000 plants/ha)

35/55 mm: 31 cm (42.000 plants/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) vóór en na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema wordt geadviseerd.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse

Afbeelding nog niet beschikbaar



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: weinig vatbaar / 6,5

Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7

Kringrigheid: - / -

Phytophthora loof: vatbaar / 5,5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Schurft: weinig vatbaar / 6,5

Poederschurft: - / -

Zwarte spikkel: - / -

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -