

# Oregon (AR 14-3578).



**Verwerkende  
industrie**  
Chips

Een middenlaat chipsras met een goede regelmaat en een hoog onderwatergewicht.

- ▶ **Regelmatige vorm en grofte**
- ▶ **Goede chipskwaliteit, ook na lange bewaring**
- ▶ **Weinig knolgebreken**



## KARAKTERISTIEKEN

### Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.  
Kruising: LEANDRA x VR 808  
Kwekersrecht: Aangevraagd  
Zaailing: AR 14-3578

### Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: laat / 5  
Kiemkleur: - / -  
Bloemkleur: licht paars / LP  
Hoeveelheid bessen: - / -  
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7  
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8  
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5  
Schilkleur: geel / Y  
Vleeskleur: lichtgeel / 6  
Schilhoedanigheid: benedengemiddeld / 5,5  
Knolvorm: ovaal rond / OR  
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5  
Knolzetting: gemiddeld / 6  
Knolgrootte: vrij grof / 7,5  
Regelmaat sortering: regelmatig / 7  
Kiemrust: gemiddeld / 6,5

### Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6  
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7  
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5  
Rooibesbeschadiging: gevoelig / 5  
Ethyleen: - / -  
Talent: - / -  
Onderwatergewicht: 465  
Drogestofgehalte: 24,9%  
Kooktype: kruimig / BC  
Grauwverkleuring (na koken): gevoelig / 5  
Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6,5  
Frietkwaliteit: bovengemiddeld / 6,5  
Drogestofverdeling: matig / 5  
Chipskwaliteit: goed / 7  
TGA-gehalte (mg/100 gr): -

# TEELTADVIES



[www.agricopotatoes.nl](http://www.agricopotatoes.nl)

## Teeltadvies <sup>1</sup>

**Stikstof:** standaard advies. Bij voorkeur opdelen in 3 giften. De tweede gift kort na knolzetting.

**Fosfaat:** standaard advies.

**Kalium:** standaard advies + 10%.

## Pootgoedbehandeling

Plant bij voorkeur als de grond iets is opgewarmd, aangezien dit ras een wat trage beginontwikkeling heeft.

## Plantafstand

30/50 mm: 30 cm (45.000 plants/ha)

## Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) voor en na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken maar geeft zelden opbrengstderving.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

## Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

## Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 9 °C. Geschikt voor middellange tot lange bewaring.

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse

Say potato,  
say Agrico.



## Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yntn (knol): - / -

Kringerigheid: vatbaar / 5

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4,5

Phytophthora knol: vatbaar / 5

Fusarium: - / -

Schurft: weinig vatbaar / 6,5

Poederschurft: - / -

Zwarte spikkel: - / -

Wratziekte F1 (D1): zwaar vatbaar\* / 1\*

Wratziekte F6 (O1): zwaar vatbaar\* / 1\*

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -