
TEELTAANBEVELING

Oregon (AR 14-3578).

Een middenlaat chips aardappelras met een goede regelmaat en een hoog onderwatergewicht.

Verwerkende industrie
Chips

- **Regelmatige vorm en grofte**
- **Goede chipskwaliteit, ook na lange bewaring**
- **Weinig knolgebreken**



Karakteristieken

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: LEANDRA x VR 808
Kwekersrecht: Aangevraagd
Zaailing: AR 14-3578

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: laat / 5
Kiemkleur: - / -
Bloemkleur: licht paars / LP
Hoeveelheid bessen: - / -
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: benedengemiddeld / 5,5
Knolvorm: ovaal rond / OR
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting: gemiddeld / 6
Knolgrootte: vrij grof / 7,5
Regelmaat sortering: regelmatig / 7
Kiemrust: gemiddeld / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
Rooibeschadiging: gevoelig / 5
Ethyleen: - / -
Talent: - / -
Onderwatergewicht: 465
Drogestofgehalte: 24,9%
Kooktype: kruimig / BC
Grauwverkleuring (na koken): gevoelig / 5
Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6,5
Frietkwaliteit: bovengemiddeld / 6,5
Drogestofverdeling: matig / 5,5
Chipskwaliteit: goed / 7
TGA-gehalte (mg/100 gr): -

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

TEELTAANBEVELING

Teeltadvies

www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies [1]

Stikstof: standaard advies.Bij voorkeur opdelen in 3 giften. De tweede gift kort na knolzetting.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

Pootgoedbehandeling

Plant bij voorkeur als de grond iets is opgewarmd, aangezien dit ras een wat trage beginontwikkeling heeft.

Plantafstand

30/40 mm: 26 cm (51.000 planten/ha)
40/50 mm: 31 cm (43.000 planten/ha)
50/60 mm: 35 cm (38.000 planten/ha)

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 9 °C. Geschikt voor middellange tot lange bewaring.

[1] Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato, say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -
Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8
Virus - Yntn (knol): - / -
Kringerigheid: vatbaar / 5
Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4,5
Phytophthora knol: vatbaar / 5
Fusarium: - / -
Schurft: weinig vatbaar / 6,5

Poederschurft: - / -
Zwarte spikkel: - / -
Wratziekte F1 (D1): zwaar vatbaar* / 1*
Wratziekte F6 (O1): zwaar vatbaar* / 1*
Wratziekte F18 (T1): - / -
Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A): resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C): - / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D): - / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E): - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord +31 (0)527 639911 info@agrico.nl agricopotatoes.nl