

Feliz (SW 14-7008).



**Retail
Salade**

Een middenvroeg saladeras met ovaallange knollen, kooktype A en een goede Y-virusresistentie.

- » **Mooie presentatie**
- » **Kooktype A, vastkokend**
- » **Goede resistentie tegen Y-virus**



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Lantmännen Seed B.V.
Kruising: LORELEY x SW 06-0296
Kwekersrecht: Aangevraagd
Zaailing: SW 14-7008

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenvroeg / 7
Kiemkleur: - / -
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: - / -
Loof - ontwikkeling begin: snel / 8
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolvorm: ovaal lang / OL
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting: hoog / 8
Knolgrootte: gemiddeld / 6,5
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: gemiddeld / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
Rooibeschatiging: weinig tot niet gevoelig / 8
Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6
Talent: 5% tot 15% meer knollen / 6
Onderwatergewicht: 358
Drogestofgehalte: 19,6%
Kooktype: vastkokend / A
Grauwverkleuring (na koken): - / -
Rauwverkleuring: zeer gevoelig / 4
Frietkwaliteit: - / -
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: - / -
TGA-gehalte (mg/100 gr): -

TEELTADVIES



www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies. Bij voorkeur opdelen in 3 giften. De tweede gift kort na knolzetting.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling

Een korte warmtestoot of goed voorkiemen wordt aanbevolen. Afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

30/50 mm: 20 cm (67.000 plants/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) voor en na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken maar geeft zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: weinig vatbaar / 7

Virus - Yntn (knol): - / -

Kringerigheid: zeer vatbaar / 4

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 3,5

Phytophthora knol: vatbaar / 5,5

Fusarium: - / -

Schurft: vatbaar / 5

Poederschurft: - / -

Zwarte spikkel: - / -

Wratziekte F1 (D1): resistent* / 10*

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): vatbaar* / 4*

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): weinig vatbaar* / 5*

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): vatbaar* / 3*