TEELTAANBEVELING

Feliz (SW 14-7008).

Een middenvroeg saladeaardappelras met ovaallange knollen, kooktype A en een goede Y-virusresistentie.

Retail
Salade

- **Mooie presentatie**
- **Kooktype A, vastkokend**
- **Goede resistentie tegen Y-virus**



Karakteristieken

Algemene kenmerken

Kweker: Lantmännen Seed B.V.
Kruising: LORELEY x SW 06-0296
Kwekersrecht: Aangevraagd
Zaailing: SW 14-7008

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenvroeg / 7
Kiemkleur: - / -
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: - / -
Loof - ontwikkeling begin: snel / 8
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolvorm: ovaal lang / OL
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting: hoog / 8
Knolgrootte: gemiddeld / 6,5
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: vrij kort / 5,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
Rooibeschadiging: weinig tot niet gevoelig / 8
Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6
Talent: 5% tot 15% meer knollen / 6
Onderwatergewicht: 358
Drogestofgehalte: 19,6%
Kooktype: vastkokend / A
Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7
Rauwverkleuring: zeer gevoelig / 4
Frietkwaliteit: - / -
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: - / -
TGA-gehalte (mg/100 gr): -

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

TEELTAANBEVELING

Teeltadvies

www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies [1]

Stikstof: standaard advies.Bij voorkeur opdelen in 3 giften. De tweede gift kort na knolzetting.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling

Een korte warmtestoot of goed voorkiemen wordt aanbevolen.Afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

30/50 mm: 20 cm (67.000 planten/ha)
40/50 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

[1] Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato, say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -
Virus - Yn: weinig vatbaar / 7
Virus - Yntn (knol): weinig tot niet vatbaar / 8
Kringerigheid: zeer vatbaar / 4
Phytophthora loof: zeer vatbaar / 3,5
Phytophthora knol: vatbaar / 5,5
Fusarium: - / -
Schurft: vatbaar / 5
Poederschurft: - / -
Zwarte spikkel: - / -
Wratziekte F1 (D1): resistent* / 10*
Wratziekte F6 (O1): - / -
Wratziekte F18 (T1): - / -
Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A): resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C): vatbaar* / 4*
Aardappelmoeheid Pa 2 (D): weinig vatbaar* / 5*
Aardappelmoeheid Pa 3 (E): vatbaar* / 3*

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord +31 (0)527 639911 info@agrico.nl agricopotatoes.nl