TEELTAANBEVELING

Texas (AR 14-3488).

Een laatrijpend, hoogopbrengend verwerkingsaardappelras voor de fritesindustrie en geschikt voor teelt op diverse grondsoorten.

- **Hoge opbrengst**
- **Hoog onderwatergewicht**
- **Brede wratziekte resistentie**

Verwerkende industrie
Frites



Karakteristieken

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: LEANDRA x AR 07-4113
Kwekersrecht: Aangevraagd
Zaailing: AR 14-3488

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 5,5
Kiemkleur: - / -
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: gemiddeld / 6
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: benedengemiddeld / 5,5
Knolvorm: ovaal lang / OL
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6
Knolgrootte: vrij grof / 7,5
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: gemiddeld / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7
Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
Rooibeschadiging: gevoelig / 5
Ethyleen: - / -
Talent: - / -
Onderwatergewicht: 427
Drogestofgehalte: 23%
Kooktype: kruimig / C
Grauwverkleuring (na koken): gevoelig / 5,5
Rauwverkleuring: zeer gevoelig / 4,5
Frietkwaliteit: uitstekend / 8
Drogestofverdeling: gemiddeld / 6,5
Chipskwaliteit: - / -
TGA-gehalte (mg/100 gr): -

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

TEELTAANBEVELING

Teeltadvies

www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies [1]

Stikstof: standaard advies.Bij voorkeur een gedeelde gift en de tweede gift kort na knolzetting.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot.

Plantafstand

28/35 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)
35/50 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)
50/55 mm: 40 cm (33.000 planten/ha)

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor lange bewaring.

[1] Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato, say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -
Virus - Yn: weinig vatbaar / 6,5
Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 6
Kringerigheid: vatbaar / 5
Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4
Phytophthora knol: vatbaar / 5,5
Fusarium: - / -
Schurft: vatbaar / 5,5

Poederschurft: - / -
Zwarte spikkel: - / -
Wratziekte F1 (D1): resistent / 10
Wratziekte F6 (O1): resistent* / 10*
Wratziekte F18 (T1): resistent / 10
Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A): resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C): - / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D): - / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E): - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord +31 (0)527 639911 info@agrico.nl agricopotatoes.nl