

Janick.



**Verwerkende
industrie**
Zetmeel

Een zetmeelras met een rode schil, goede opbrengst en Phytophthora resistentie in loof en knol.

Image:

- » **Hoog drogestofgehalte**
- » **Geschikt voor de zetmeelindustrie**
- » **Phytophthora resistent**

Karakteristieken

Algemene kenmerken

Kweker: AKV Langholt

Kruising: SC 05-4661 x AR 02-3921

Zaailing: PL 13-0304

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: laat / 4

Kiemkleur: - / -

Bloemkleur: violet / V

Hoeveelheid bessen: zeer veel / 4

Loof - ontwikkeling begin: snel / 8

Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8

Loof - stevigheid plant: stevig / 8

Schilkleur: rood / R

Vleeskleur: lichtgeel / 6,5

Schilhoedanigheid: matig / 5

Knolvorm: ovaal rond / OR

Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7

Knolzetting: vrij hoog / 7

Knolgrootte: grof / 8

Regelmaat sortering: regelmatig / 7

Kiemrust: vrij kort / 5,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6

Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6

Groeischeuren: weinig gevoelig / 7

Rooibeschatiging: gevoelig / 5

Ethyleen: 5% minder tot 5% meer knollen / 5

Talent: 5% tot 15% meer knollen / 6

Onderwatergewicht: 497

Drogestofgehalte: 26,5%

Kooktype: kruimig / C

Grauwverkleuring (na koken): - / -

Rauwverkleuring: - / -

Frietkwaliteit: - / -

Drogestofverdeling: - / -

Chipskwaliteit: benedengemiddeld / 5,5

TGA-gehalte (mg/100 gr): 7,3 mg/100g

S_Harvestability: - / -

Teeltadvies



www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies - 10%. Bij voorkeur opdelen in 3 giften. De tweede gift kort na knolzetting.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

35/50 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse

Schimmels

Ondanks de phytophthora resistentie, blijf alert voor infecties.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor middellange tot lange bewaring.

Image:

Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yntn (knol): - / -

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6

Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 4

Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 9

Fusarium: - / -

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: - / -

Zwarte spikkel: - / -

R_PCN Tolerance: - / -

Wratziekte F1 (D1): zwaar vatbaar* / 1*

Wratziekte F6 (O1): zwaar vatbaar* / 1*

Wratziekte F18 (T1): zwaar vatbaar* / 1*

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C): weinig vatbaar / 5

Aardappelmoeheid Pa 2 (D): weinig vatbaar / 6

Aardappelmoeheid Pa 3 (E): vatbaar / 3