

# Agata.

Een zeer vroeg, vrij vastkokende aardappel voor consumptie met een mooie gladde schil en een hoge opbrengst.



**Retail**  
Vers



**Traditioneel**

- ▶ **Zeer vroege rijptijd**
- ▶ **Goede virusresistenties**
- ▶ **Weinig gevoelig voor blauw en beschadiging**



## characteristics

### Algemene kenmerken

**Kweker:** Lantmännen Seed B.V.  
**Kruising:** BM 72-0052 x SIRCO  
**Kwekersrecht:** Verlopen  
**Zaailing:** GE 77-0134

### Plant- en knoleigenschappen

**Rijptijd:** zeer vroeg / 8  
**Kiemkleur:** rood paars / RV  
**Bloemkleur:** wit / W  
**Hoeveelheid bessen:** bovengemiddeld / 5  
**Loof - ontwikkeling begin:** snel / 8  
**Loof - ontwikkeling volledig:** goed / 8  
**Loof - stevigheid plant:** gemiddeld / 6  
**Schilkleur:** geel / Y  
**Vleeskleur:** lichtgeel / 6  
**Schilhoedanigheid:** uitstekend / 8  
**Knolvorm:** ovaal / O  
**Regelmaat knolvorm:** regelmatig / 7  
**Knolzetting:** hoog / 8  
**Knalgrootte:** vrij grof / 7  
**Regelmaat sortering:** vrij regelmatig / 6  
**Kiemrust:** kort / 4

### Gevoeligheid en kwaliteit

**Doorwas:** redelijk gevoelig / 6  
**Blauwgevoeligheid:** weinig tot niet gevoelig / 8  
**Groeischeuren:** redelijk gevoelig / 6  
**Roibeschatiging:** weinig gevoelig / 7  
**Ethyleen:** 5% minder tot 5% meer knollen / 5  
**Talent:** 5% minder tot 5% meer knollen / 5  
**Onderwatergewicht:** 316  
**Drogestofgehalte:** 17,6%  
**Kooktype:** vrij vastkokend / AB  
**Grauwverkleuring (na koken):** redelijk gevoelig / 6  
**Rauwverkleuring:** redelijk gevoelig / 6,5  
**Frietkwaliteit:** niet geschikt / 4  
**Drogestofverdeling:** - / -  
**Chipskwaliteit:** niet geschikt / 4  
**TGA-gehalte:** 8

# How to grow



[www.agricopotatoes.nl](http://www.agricopotatoes.nl)

## Teeltadvies <sup>1</sup>

**Stikstof:** standaard advies + 20%. Bij voorkeur een gedeelde gift en de tweede gift kort na knolzetting.

**Fosfaat:** standaard advies.

**Kalium:** standaard advies.

## Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

## Planting distance

28/35 mm: 20 cm (67.000 planten/ha)

35/50 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse

## Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) vóór en na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken en kan enige opbrengstderving geven.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

## Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

## Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor lange bewaring.



Say potato,  
say Agrico.

## Resistenties

**Virus - Bladrol:** weinig vatbaar / 6

**Virus - Yn:** weinig vatbaar / 7

**Virus - Yntn (knol):** weinig tot niet vatbaar / 8

**Kringerigheid:** weinig vatbaar / 6,5

**Phytophthora loof:** vatbaar / 5

**Phytophthora knol:** weinig vatbaar / 6

**Fusarium:** vatbaar / 5

**Schurft:** vatbaar / 5

**Poederschurft:** weinig vatbaar / 6

**Zwarte spikkel:** weinig vatbaar / 6,5

**Wratziekte F1 (D1):** resistent / 10

**Wratziekte F6 (O1):** - / -

**Wratziekte F18 (T1):** - / -

**Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A):** resistent / 9

**Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C):** - / -

**Aardappelmoetheid Pa 2 (D):** - / -

**Aardappelmoetheid Pa 3 (E):** - / -