TEELTAANBEVELING

Agria.

Een late, geelvlezige aardappel voor verwerking met een goede opbrengst en een zeer stabiele kwaliteit.

Biologisch

Verwerkende industrie
Frites
Chips
Koelvers

Retail
Vers

Traditioneel

- **Goede bakkwaliteit**
- **Brede virusresistenties**
- **Goede bewaarbaarheid**



Karakteristieken

Algemene kenmerken

Kweker: Böhm
Kruising: QUARTA x SEMLO
Kwekersrecht: Verlopen
Zaailing: BM 77-0945

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: laat / 5
Kiemkleur: blauw paars / BV
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: geen / 8
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolvorm: ovaal lang / OL
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: vrij laag / 5
Knolgrootte: grof / 8
Regelmaat sortering: regelmatig / 7
Kiemrust: lang / 8

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
Rooibeschadiging: gevoelig / 5
Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6
Talent: 25% meer knollen / 8
Onderwatergewicht: 402
Drogestofgehalte: 21,8%
Kooktype: kruimig / BC
Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7
Rauwverkleuring: weinig gevoelig / 7
Frietkwaliteit: uitstekend / 8
Drogestofverdeling: gemiddeld / 6,5
Chipskwaliteit: goed / 7
TGA-gehalte (mg/100 gr): 2,7 mg/100g

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

AGRICO

TEELTAANBEVELING

Teeltadvies

www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies [1]

Stikstof: standaard advies - 10%.
Fosfaat: standaard advies.
Kalium: standaard advies + 10%.

Pootgoedbehandeling

Een korte warmtestoot of goed voorkiemen wordt aanbevolen.Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting.

Plantafstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)
35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)
50/55 mm: 40 cm (33.000 planten/ha)

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema wordt geadviseerd.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor lange bewaring.

[1] Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato, say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 6
Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8
Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7
Kringerigheid: weinig vatbaar / 7
Phytophthora loof: vatbaar / 5,5
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7
Fusarium: weinig vatbaar / 6,5
Schurft: zeer vatbaar / 4,5

Poederschurft: zeer vatbaar / 3
Zwarte spikkel: - / -
Wratziekte F1 (D1): weinig vatbaar / 9
Wratziekte F6 (O1): matig vatbaar / 6
Wratziekte F18 (T1): - / -
Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A): resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C): - / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D): vatbaar / 2
Aardappelmoeheid Pa 3 (E): vatbaar / 2

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord +31 (0)527 639911 info@agrico.nl agricopotatoes.nl