

Ailstar.

Een laat zetmeelras met een goede zetmeelopbrengst en brede wratziekte-resistenties.



**Verwerkende
industrie**
Zetmeel

- » **Vrij grove knollen**
- » **Hoog onderwatergewicht**
- » **Zeer brede resistenties**



Karakteristieken

Algemene kenmerken

Kweker: J.L. Spijkman
Kruising: KURAS x SERESTA
Kwekersrecht: 31-12-2045
Zaailing: SA 05-0204

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: laat / 4,5
Kiemkleur: blauw paars / BV
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: zeer veel / 4
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: crème / 5
Schilhoedanigheid: matig / 5
Knolvorm: rond ovaal / RO
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6
Knolzetting: vrij hoog / 7
Knalgrootte: vrij grof / 7
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6
Kiemrust: gemiddeld / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: zeer gevoelig / 4
Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
Rooibeschatting: gevoelig / 5
Ethyleen: 15% tot 25% meer knollen / 7
Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7
Onderwatergewicht: 508
Drogestofgehalte: 27%
Kooktype: kruimig / C
Grauwverkleuring (na koken): zeer gevoelig / 4
Rauwverkleuring: - / -
Frietkwaliteit: niet geschikt / 4
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: niet geschikt / 5
TGA-gehalte (mg/100 gr): 10,1 mg/100g
S_Harvestability: - / -


www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies + 5%. Bij voorkeur een gedeelde gift en de tweede gift kort na knolzetting.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 20%.

Pootgoedbehandeling

Een korte warmtestoot of goed voorkiemen wordt aanbevolen. Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Eén keer afkiemen is optioneel.

Plantafstand

28/35 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)

Allstar heeft lange stolonen, hierom het ras niet te diep poten.

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema wordt geadviseerd.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yntn (knol): weinig tot niet vatbaar / 9

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6

Phytophthora loof: weinig vatbaar / 6

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6,5

Fusarium: - / -

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: weinig tot niet vatbaar / 8

Zwarte spikkel: - / -

R_PCN Tolerance: - / -

Wratziekte F1 (D1): weinig vatbaar / 9

Wratziekte F6 (O1): resistent / 10

Wratziekte F18 (T1): weinig vatbaar / 9

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): vatbaar / 4

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): weinig vatbaar / 6

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): vatbaar / 4