TEELTAANBEVELING

Alouette.

Een middenlate, veelzijdige roodschillige aardappel met Phytophthora-tolerantie in loof en knol, geschikt voor conventionele en biologische teelt.

- **Regelmatige vorm en sortering**
- **Geschikt voor diverse gerechten**
- **Natuurlijke resistentie tegen Phytophthora**

Biologisch | **Verwerkende industrie** Koelvers | **Retail** Vers | **Traditioneel**



Karakteristieken

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: AR 02-139-1 x LAURA
Kwekersrecht: 31-12-2044
Zaailing: AR 04-3153

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 6
Kiemkleur: rood paars / RV
Bloemkleur: licht paars / LP
Hoeveelheid bessen: zeer veel / 4
Loof - ontwikkeling begin: snel / 8
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5
Schilkleur: rood / R
Vleeskleur: geel / 7,5
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolvorm: ovaal lang / OL
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6
Knolgrootte: vrij grof / 7
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: gemiddeld / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
Rooibeschadiging: redelijk gevoelig / 6
Ethyleen: 5% minder knollen / 4
Talent: 5% tot 15% meer knollen / 6
Mutantvorming: Bij het gebruik van Talent kan mutantvorming optreden. / Use of carvone oil can provoke mutations.
Onderwatergewicht: 389
Drogestofgehalte: 21,1%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7
Rauwverkleuring: weinig gevoelig / 7
Frietkwaliteit: bovengemiddeld / 6,5
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: - / -
TGA-gehalte (mg/100 gr): 3,6 mg/100g

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

AGRICO

TEELTAANBEVELING

Teeltadvies

www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies [1]

Stikstof: standaard advies + 10%.
Fosfaat: standaard advies.
Kalium: standaard advies + 20%.

Pootgoedbehandeling

Plant bij voorkeur als de grond iets is opgewarmd, aangezien dit ras een wat trage beginontwikkeling heeft.Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting.Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 20 cm (67.000 planten/ha)
35/55 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

[1] Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse

Schimmels

Ondanks de phytophthora resistentie, blijf alert voor infecties.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



Say potato, say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -
Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8
Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7
Kringerigheid: vatbaar / 5,5
Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9
Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 9
Fusarium: weinig vatbaar / 7,5
Schurft: weinig vatbaar / 6
Poederschurft: weinig vatbaar / 6,5
Zwarte spikkel: - / -
Wratziekte F1 (D1): resistent / 10
Wratziekte F6 (O1): - / -
Wratziekte F18 (T1): - / -
Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A): resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C): partieel resistent / 8
Aardappelmoeheid Pa 2 (D): - / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E): - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord +31 (0)527 639911 info@agrico.nl agricopotatoes.nl