

# Arizona.



Traditioneel

Een middenvroeg aardappelras voor consumptie met een hoge opbrengst onder diverse klimatologische omstandigheden.

- ▶ **Vroeg een hoge opbrengst**
- ▶ **Goede droogtetolerantie**
- ▶ **Goede resistentie tegen virussen**
- ▶ **Groeit in elk klimaat**



## characteristics

### Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.  
 Kruising: UK 150-19D22 x MASCOTTE  
 Kwekersrecht: 31-12-2040  
 Zaailing: AR 98-0313

### Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenvroeg / 7  
 Kiemkleur: rood paars / RV  
 Bloemkleur: wit / W  
 Hoeveelheid bessen: bovengemiddeld / 5  
 Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7  
 Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8  
 Loof - stevigheid plant: gemiddeld / 6  
 Schilkleur: geel / Y  
 Vleeskleur: lichtgeel / 6  
 Schilhoedanigheid: bovengemiddeld / 6,5  
 Knolvorm: ovaal / O  
 Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7,5  
 Knolzetting: gemiddeld / 6  
 Knalgrootte: grof / 8  
 Regelmaat sortering: regelmatig / 7  
 Kiemrust: gemiddeld / 6

### Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: weinig gevoelig / 7  
 Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7  
 Groeischeuren: weinig gevoelig / 7  
 Rooibeschatiging: weinig gevoelig / 7  
 Ethyleen: 15% tot 25% meer knollen / 7  
 Talent: 5% tot 15% meer knollen / 6  
 Onderwatergewicht: 301  
 Drogestofgehalte: 17%  
 Kooktype: vrij vastkokend / AB  
 Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5  
 Rauwverkleuring: - / -  
 Frietkwaliteit: niet geschikt / 4  
 Drogestofverdeling: - / -  
 Chipskwaliteit: niet geschikt / 4  
 TGA-gehalte: 4,2

# How to grow



[www.agricopotatoes.nl](http://www.agricopotatoes.nl)

## Teeltadvies <sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies - 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

## Pootgoedbehandeling

Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

## Planting distance

28/35 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)

## Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) voor en na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken en kan enige opbrengstderving geven.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

## Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

## Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,  
say Agrico.

## Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yntn (knol): weinig tot niet vatbaar / 8

Kringerigheid: vatbaar / 5

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4

Phytophthora knol: vatbaar / 5

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Schurft: vatbaar / 5,5

Poederschurft: zeer vatbaar / 2

Zwarte spikkel: zeer vatbaar / 4

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): matig vatbaar / 6

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -