

Arizona.



Traditioneel

Een middenvroeg aardappelras voor consumptie met een hoge opbrengst onder diverse klimatologische omstandigheden.

- ▶ **Vroeg een hoge opbrengst**
- ▶ **Goede droogtetolerantie**
- ▶ **Goede resistentie tegen virussen**
- ▶ **Groeit in elk klimaat**



characteristics

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
 Kruising: UK 150-19D22 x MASCOTTE
 Kwekersrecht: 31-12-2040
 Zaailing: AR 98-0313

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenvroeg / 7
 Kiemkleur: rood paars / RV
 Bloemkleur: wit / W
 Hoeveelheid bessen: bovengemiddeld / 5
 Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
 Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
 Loof - stevigheid plant: gemiddeld / 6
 Schilkleur: geel / Y
 Vleeskleur: lichtgeel / 6
 Schilhoedanigheid: bovengemiddeld / 6,5
 Knolvorm: ovaal / O
 Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7,5
 Knolzetting: gemiddeld / 6
 Knalgrootte: grof / 8
 Regelmaat sortering: regelmatig / 7
 Kiemrust: gemiddeld / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: weinig gevoelig / 7
 Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7
 Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
 Rooibeschatting: weinig gevoelig / 7
 Ethyleen: 15% tot 25% meer knollen / 7
 Talent: 5% tot 15% meer knollen / 6
 Onderwatergewicht: 301
 Drogestofgehalte: 17%
 Kooktype: vrij vastkokend / AB
 Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5
 Rauwverkleuring: - / -
 Frietkwaliteit: niet geschikt / 4
 Drogestofverdeling: - / -
 Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
 TGA-gehalte: 4,2

How to grow



www.agricopotatoes.com

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies - 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling

Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Planting distance

28/35 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik geen Metribuzin (Sencor). Dit geeft een ernstige loofreactie en opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yntn (knol): weinig tot niet vatbaar / 8

Kringerigheid: vatbaar / 5

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4

Phytophthora knol: vatbaar / 5

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Schurft: vatbaar / 5,5

Poederschurft: zeer vatbaar / 2

Zwarte spikkel: zeer vatbaar / 4

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): matig vatbaar / 6

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -