TEELTAANBEVELING

Arizona.

Een middenvroeg aardappelras voor consumptie met een hoge opbrengst onder diverse klimatologische omstandigheden.

Traditioneel



- **Vroeg een hoge opbrengst**
- **Goede droogtetolerantie**
- **Goede resistentie tegen virussen**
- **Groeit in elk klimaat**

Karakteristieken

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: UK 150-19D22 x MASCOTTE
Kwekersrecht: 31-12-2040
Zaailing: AR 98-0313

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenvroeg / 7
Kiemkleur: rood paars / RV
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: bovengemiddeld / 5
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: gemiddeld / 6
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: bovengemiddeld / 6,5
Knolvorm: ovaal / O
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7,5
Knolzetting: gemiddeld / 6
Knolgrootte: grof / 8
Regelmaat sortering: regelmatig / 7
Kiemrust: gemiddeld / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7
Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
Rooibeschadiging: weinig gevoelig / 7
Ethyleen: 15% tot 25% meer knollen / 7
Talent: 5% tot 15% meer knollen / 6
Onderwatergewicht: 301
Drogestofgehalte: 17%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5
Rauwverkleuring: - / -
Frietkwaliteit: niet geschikt / 4
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
TGA-gehalte (mg/100 gr): 4,2 mg/100g

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

TEELTAANBEVELING

Teeltadvies

www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies [1]

Stikstof: standaard advies - 10%.
Fosfaat: standaard advies.
Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling

Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)
35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

[1] Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato, say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -
Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8
Virus - Yntn (knol): weinig tot niet vatbaar / 8
Kringerigheid: vatbaar / 5
Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4
Phytophthora knol: vatbaar / 5
Fusarium: weinig vatbaar / 6
Schurft: vatbaar / 5,5

Poederschurft: zeer vatbaar / 2
Zwarte spikkel: zeer vatbaar / 4
Wratziekte F1 (D1): resistent / 10
Wratziekte F6 (O1): matig vatbaar / 6
Wratziekte F18 (T1): - / -
Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A): resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C): - / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D): - / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E): - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord +31 (0)527 639911 info@agrico.nl agricopotatoes.nl