


Armedi.

Een middenlaat aardappelras voor verwerking, geschikt voor de fritesindustrie.



**Verwerkende
industrie**
Frites

- ▶ **Uitstekende friteskwaliteit**
- ▶ **Prachtige lang-ovale knollen**
- ▶ **Breed resistent tegen aardappelcysteaaltjes (PCN)**
- ▶ **Goede bewaarbaarheid**
- ▶ **Hoge opbrengst**



characteristics

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: TOPAS x BASIN RUSSET
Kwekersrecht: 31-12-2051
Zaailing: AR 10-2432

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 5,5
Kiemkleur: - / -
Bloemkleur: paars / P
Hoeveelheid bessen: gemiddeld / 6
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: stevig / 8
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolvorm: ovaal lang / OL
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6,5
Knolgrootte: vrij grof / 7,5
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: gemiddeld / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6,5
Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
Roibeschatting: zeer gevoelig / 4,5
Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6
Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7
Onderwatergewicht: 402
Drogestofgehalte: 21,8%
Kooktype: kruimig / C
Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7
Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6,5
Frietkwaliteit: uitstekend / 8
Drogestofverdeling: gemiddeld / 6,5
Chipskwaliteit: goed / 7
TGA-gehalte: 6,0

How to grow



www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies + 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 25%.

Pootgoedbehandeling

Een korte warmtestoot of goed voorkiemen wordt aanbevolen. Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting.

Planting distance

28/35 mm: 25 cm (55.000 planten/ha)

35/55 mm: 34 cm (40.000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik geen Metribuzin (Sencor). Dit geeft een ernstige loofreactie en opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor lange bewaring.

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: zeer vatbaar / 4,5

Virus - Yntn (knol): - / -

Kringerigheid: weinig vatbaar / 7,5

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7,5

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Schurft: vatbaar / 5,5

Poederschurft: vatbaar / 5,5

Zwarte spikkel: vatbaar / 5,5

Wratziekte F1 (D1): weinig vatbaar / 9

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): partieel resistent / 7

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): resistent / 9

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): partieel resistent / 8