TEELTAANBEVELING

Arsenal.

Een middenlaat aardappelras voor chips met een brede G. pallida-resistentie en een goede opbrengst.

Verwerkende industrie
Chips
Vlokken

- **Brede resistenties**
- **Zowel geschikt voor chips als vlokken**
- **Hoog onderwatergewicht**



Karakteristieken

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: AR 92-1146 x SILVESTER
Kwekersrecht: 31-12-2040
Zaailing: AR 98-0851

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 5,5
Kiemkleur: blauw paars / BV
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: zeer veel / 4
Loof - ontwikkeling begin: gemiddeld / 6,5
Loof - ontwikkeling volledig: gemiddeld / 7
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: matig / 5
Knolvorm: rond ovaal / RO
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting: vrij hoog / 7
Knolgrootte: vrij grof / 7
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: vrij kort / 5

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren: gevoelig / 5
Rooibeschadiging: weinig gevoelig / 7
Ethyleen: - / -
Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7
Onderwatergewicht: 447
Drogestofgehalte: 24%
Kooktype: kruimig / BC
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6
Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6,5
Frietkwaliteit: zeer goed / 7,5
Drogestofverdeling: goed / 7,5
Chipskwaliteit: goed / 7
TGA-gehalte (mg/100 gr): 4,1 mg/100g

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

TEELTAANBEVELING

Teeltadvies

www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies [1]

Stikstof: standaard advies.
Fosfaat: standaard advies.
Kalium: standaard advies + 10%.

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting.Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)
35/50 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 9 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

[1] Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato, say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -
Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8
Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 6,5
Kringerigheid: weinig vatbaar / 7
Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4,5
Phytophthora knol: vatbaar / 5,5
Fusarium: vatbaar / 5
Schurft: vatbaar / 5
Poederschurft: weinig tot niet vatbaar / 8
Zwarte spikkel: - / -
Wratziekte F1 (D1): resistent / 10
Wratziekte F6 (O1): - / -
Wratziekte F18 (T1): - / -
Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A): resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C): partieel resistent / 8
Aardappelmoeheid Pa 2 (D): resistent / 9
Aardappelmoeheid Pa 3 (E): partieel resistent / 8

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord +31 (0)527 639911 info@agrico.nl agricopotatoes.nl