TEELTAANBEVELING

Artemis.

Een middenvroeg aardappelras voor consumptie met een goede opbrengst en tevens geschikt voor thuisfrites.

- **Goede bakkwaliteit**
- **Weinig gevoelig voor blauw en beschadiging**
- **Brede resistenties**

Retail
Vers

Traditioneel



Karakteristieken

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: RIANTA x RENSKA
Kwekersrecht: 31-12-2029
Zaailing: AR 87-0039

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenvroeg / 7
Kiemkleur: groen / G
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: zeer veel / 4
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
Loof - ontwikkeling volledig: gemiddeld / 7
Loof - stevigheid plant: gemiddeld / 6
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolvorm: ovaal lang / OL
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: vrij hoog / 7
Knolgrootte: vrij grof / 7
Regelmaat sortering: regelmatig / 7
Kiemrust: vrij kort / 5,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
Rooibeschadiging: redelijk gevoelig / 6,5
Ethyleen: - / -
Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7
Onderwatergewicht: 375
Drogestofgehalte: 20,4%
Kooktype: vrij kruimig / B
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6
Rauwverkleuring: - / -
Frietkwaliteit: gemiddeld / 6
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: gemiddeld / 6
TGA-gehalte (mg/100 gr): 4,9 mg/100g

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

TEELTAANBEVELING

Teeltadvies

www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies [1]

Stikstof: standaard advies + 10%.
Fosfaat: standaard advies.
Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling

Plant bij voorkeur als de grond iets is opgewarmd, aangezien dit ras een wat trage beginontwikkeling heeft.Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting.

Plantafstand

28/35 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)
35/55 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

[1] Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato, say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 7
Virus - Yn: weinig vatbaar / 6,5
Virus - Yntn (knol): weinig tot niet vatbaar / 8
Kringerigheid: weinig vatbaar / 6
Phytophthora loof: vatbaar / 5
Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 8
Fusarium: vatbaar / 5
Schurft: vatbaar / 5,5
Poederschurft: vatbaar / 5,5
Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 7
Wratziekte F1 (D1): resistent / 10
Wratziekte F6 (O1): - / -
Wratziekte F18 (T1): - / -
Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A): resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C): - / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D): - / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E): - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord +31 (0)527 639911 info@agrico.nl agricopotatoes.nl