

Babylon.

Een laat, geelvezig aardappelras voor verwerking met een goede opbrengst en een zeer stabiele kwaliteit.



**Verwerkende
industrie**
Frites
Koelvers



**Retail
Vers**



Traditioneel

- ▶ **Veelzijdig ras**
- ▶ **Hoge opbrengst**
- ▶ **Uitstekende friteskwaliteit**
- ▶ **Goede bewaarbaarheid**
- ▶ **Goede resistentie tegen virussen**



characteristics

Algemene kenmerken

Kweker: R.K. Bakker
Kruising: AGRIA MUTANT
Kwekersrecht: 31-12-2046
Zaailing: BA 06-0001

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: laat / 5
Kiemkleur: blauw paars / BV
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: geen / 8
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: stevig / 8
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6
Knolvorm: ovaal lang / OL
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6
Knolgrootte: grof / 8
Regelmaat sortering: regelmatig / 7
Kiemrust: lang / 8

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6
Roibeschatting: gevoelig / 5,5
Ethyleen: 5% minder tot 5% meer knollen / 5
Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7
Onderwatergewicht: 401
Drogestofgehalte: 21,7%
Kooktype: kruimig / BC
Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7
Rauwverkleuring: weinig gevoelig / 7
Frietkwaliteit: uitstekend / 8
Drogestofverdeling: goed / 7
Chipskwaliteit: goed / 7
TGA-gehalte: 5,2

How to grow



www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies - 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting.

Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

35/55 mm: 30 cm (44.000 planten/ha)

50/55 mm: 38 cm (35.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) vóór en na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken en kan enige opbrengstderving geven.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema wordt geadviseerd.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofddoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor lange bewaring.

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: weinig vatbaar / 7,5

Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6,5

Phytophthora loof: vatbaar / 5,5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6,5

Fusarium: weinig vatbaar / 7

Schurft: vatbaar / 5

Poederschurft: - / -

Zwarte spikkel: zeer vatbaar / 4,5

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): partieel resistent / 8

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -