

Cerisa.



Retail
Salade

Een vroege, fijnvallende, roodschillige aardappel voor tafel- en saladespecialiteiten met een excellente smaak.

- ▶ **Zeer hoge knolzetting**
- ▶ **Bijzonder smaak- en bereidingseigenschappen**
- ▶ **Goede virusresistenties**



characteristics

Algemene kenmerken

Kweker: Desmazières
Kruising: FRANCINE x LAURA
Kwekersrecht: 31-12-2041
Zaailing: DM 99-063-07

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: vroeg / 7,5
Kiemkleur: rood paars / RV
Bloemkleur: licht paars / LP
Hoeveelheid bessen: zeer veel / 4
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: gemiddeld / 7
Loof - stevigheid plant: vrij slap / 5,5
Schilkleur: rood / R
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: uitstekend / 8
Knolvorm: lang / L
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: hoog / 9
Knalgrootte: gemiddeld / 6
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6
Kiemrust: gemiddeld / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7
Groeischeuren: gevoelig / 5
Roibeschatiging: weinig gevoelig / 7
Ethyleen: - / -
Talent: 5% minder tot 5% meer knollen / 5
Onderwatergewicht: 391
Drogestofgehalte: 21,3%
Kooktype: vastkokend / A
Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7
Rauwverkleuring: gevoelig / 5,5
Frietkwaliteit: niet geschikt / 5
Drogestofverdeling: uitstekend / 8
Chipskwaliteit: niet geschikt / 4,5
TGA-gehalte: 5,5

How to grow



www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies - 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Planting distance

30/50 mm: 20 cm (67.000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik geen Metribuzin (Sencor). Dit geeft een ernstige loofreactie en opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor middellange tot lange bewaring.

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7

Kringerigheid: vatbaar / 5

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: weinig vatbaar / 6

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1): - / -

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): - / -

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -