

Chateau.



**Retail
Salade**

Een vroege aardappel voor salades met een goede knolzetting en een redelijk onderwatergewicht.

- ▶ **Goede schilkwaliteit**
- ▶ **Predikaat chair ferme**
- ▶ **Goede knolzetting**



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
 Kruising: MA 98-0322 x AR 98-0341
 Kwekersrecht: 31-12-2046
 Zaailing: AR 05-1443

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: vroeg / 7,5
 Kiemkleur: blauw paars / BV
 Bloemkleur: wit / W
 Hoeveelheid bessen: bovengemiddeld / 5,5
 Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
 Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
 Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7
 Schilkleur: geel / Y
 Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
 Schilhoedanigheid: goed / 7
 Knolvorm: lang ovaal / LO
 Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
 Knolzetting: hoog / 8
 Knolgrootte: vrij grof / 7
 Regelmaat sortering: regelmatig / 7
 Kiemrust: gemiddeld / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
 Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
 Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
 Rooibeschatiging: gevoelig / 5
 Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6
 Talent: 5% tot 15% meer knollen / 6
 Onderwatergewicht: 350
 Drogestofgehalte: 19,2%
 Kooktype: vrij vastkokend / AB
 Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7,5
 Rauwverkleuring: weinig gevoelig / 7,5
 Frietkwaliteit: niet geschikt / 4
 Drogestofverdeling: - / -
 Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
 TGA-gehalte: 4,2

TEELTADVIES



www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 20%.

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

30/40 mm: 23 cm (58.000 planten/ha)

40/50 mm: 26 cm (51.500 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) voor en na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken en kan enige opbrengstderving geven.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: weinig vatbaar / 7

Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 6,5

Kringerigheid: vatbaar / 5

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4

Phytophthora knol: vatbaar / 5,5

Fusarium: weinig vatbaar / 7

Schurft: vatbaar / 5,5

Poederschurft: zeer vatbaar / 2

Zwarte spikkel: zeer vatbaar / 4,5

Wratziekte F1 (D1): licht vatbaar / 8

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -