

Constance.

Een middenvroeg aardappelras voor consumptie met een prachtige gele huid en lichtgele vleeskleur.



Retail
Vers



Traditioneel

- ▶ **Prachtige uitstraling**
- ▶ **Middenvroeg rijptijd**
- ▶ **Vrij vastkokend**



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: J.L. Spijkman
Kruising: MARABEL x AR 93-1243
Kwekersrecht: 31-12-2044
Zaailing: SA 02-0020

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenvroeg / 7
Kiemkleur: blauw paars / BV
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: gemiddeld / 6
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: uitstekend / 8
Knolvorm: ovaal rond / OR
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6
Knalgrootte: vrij grof / 7
Regelmaat sortering: regelmatig / 7
Kiemrust: gemiddeld / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
Roibeschatiging: zeer gevoelig / 4,5
Ethyleen: 15% tot 25% meer knollen / 7
Talent: 5% tot 15% meer knollen / 6
Onderwatergewicht: 358
Drogestofgehalte: 19,7%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5
Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6,5
Frietkwaliteit: benedengemiddeld / 5,5
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
TGA-gehalte: 4,3

TEELTADVIES



www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies + 15%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 15%.

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

35/55 mm: 36 cm (37.000 planten/ha)

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) vóór en na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken maar geeft zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 6,5

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6

Phytophthora loof: vatbaar / 5

Phytophthora knol: zeer vatbaar / 4,5

Fusarium: weinig vatbaar / 6,5

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: zeer vatbaar / 3

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1): - / -

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): - / -

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -