TEELTAANBEVELING

Constance.

Een middenvroeg aardappelras voor consumptie met een prachtige gele huid en lichtgele vleeskleur.

- **Prachtige uitstraling**
- **Middenvroege rijptijd**
- **Vrij vastkokend**

Retail
Vers

Traditioneel



Karakteristieken

Algemene kenmerken

Kweker: J.L. Spijkman
Kruising: MARABEL x AR 93-1243
Kwekersrecht: 31-12-2044
Zaailing: SA 02-0020

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenvroeg / 7
Kiemkleur: blauw paars / BV
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: gemiddeld / 6
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: uitstekend / 8
Knolvorm: ovaal rond / OR
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6
Knolgrootte: vrij grof / 7
Regelmaat sortering: regelmatig / 7
Kiemrust: gemiddeld / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
Rooibeschadiging: zeer gevoelig / 4,5
Ethyleen: 15% tot 25% meer knollen / 7
Talent: 5% tot 15% meer knollen / 6
Onderwatergewicht: 358
Drogestofgehalte: 19,7%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5
Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6,5
Frietkwaliteit: benedengemiddeld / 5,5
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
TGA-gehalte (mg/100 gr): 4,3 mg/100g

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

AGRICO

TEELTAANBEVELING

Teeltadvies

www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies [1]

Stikstof: standaard advies + 15%.
Fosfaat: standaard advies.
Kalium: standaard advies + 15%.

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting.Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)
35/55 mm: 36 cm (37.000 planten/ha)

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

[1] Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato, say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -
Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8
Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 6,5
Kringerigheid: weinig vatbaar / 6
Phytophthora loof: vatbaar / 5
Phytophthora knol: zeer vatbaar / 4,5
Fusarium: weinig vatbaar / 6,5
Schurft: weinig vatbaar / 6
Poederschurft: zeer vatbaar / 3
Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 7
Wratziekte F1 (D1): - / -
Wratziekte F6 (O1): - / -
Wratziekte F18 (T1): - / -
Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A): - / -
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C): - / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D): - / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E): - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord +31 (0)527 639911 info@agrico.nl agricopotatoes.nl