TEELTAANBEVELING

Corazon.

Een middenvroeg aardappelras voor consumptie met een rode schilkleur en vroeg een goede opbrengst.

- **Goede schilkwaliteit**
- **Vrij vastkokend**
- **Goede knolzetting**

Retail
Vers

Traditioneel



Karakteristieken

Algemene kenmerken

Kweker: Lantmännen Seed B.V.
Kruising: EVOLUTION x MANITOU
Kwekersrecht: 31-12-2048
Zaailing: SW 07-1082

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenvroeg / 7
Kiemkleur: rood / R
Bloemkleur: licht paars / LP
Hoeveelheid bessen: zeer veel / 4
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7
Schilkleur: rood / R
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolvorm: ovaal lang / OL
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: vrij hoog / 7
Knolgrootte: vrij grof / 7
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6
Kiemrust: vrij kort / 5,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7,5
Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
Rooibeschadiging: weinig gevoelig / 7
Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6
Talent: 25% meer knollen / 8
Onderwatergewicht: 321
Drogestofgehalte: 17,8%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6
Rauwverkleuring: - / -
Frietkwaliteit: benedengemiddeld / 5,5
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
TGA-gehalte (mg/100 gr): 10 mg/100g

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

AGRICO

TEELTAANBEVELING

Teeltadvies

www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies [1]

Stikstof: standaard advies + 10%.
Fosfaat: standaard advies.
Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting.Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)
35/55 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor middellange tot lange bewaring.

[1] Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato, say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -
Virus - Yn: vatbaar / 5,5
Virus - Yntn (knol): weinig tot niet vatbaar / 8,5
Kringerigheid: vatbaar / 5,5
Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4,5
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6,5
Fusarium: vatbaar / 5,5
Schurft: weinig vatbaar / 6
Poederschurft: zeer vatbaar / 4,5
Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 7,5
Wratziekte F1 (D1): resistent / 10
Wratziekte F6 (O1): weinig vatbaar / 9
Wratziekte F18 (T1): - / -
Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A): resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C): resistent / 9
Aardappelmoeheid Pa 2 (D): - / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E): - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord +31 (0)527 639911 info@agrico.nl agricopotatoes.nl