

# Corazon.

Een middenvroeg aardappelras voor consumptie met een rode schilkleur en vroeg een goede opbrengst.



**Retail**  
Vers



**Traditioneel**

- ▶ **Goede schilkwiteit**
- ▶ **Vrij vastkokend**
- ▶ **Brede resistenties**



## characteristics

### Algemene kenmerken

**Kweker:** Lantmännen Seed B.V.  
**Kruising:** EVOLUTION x MANITOU  
**Kwekersrecht:** 31-12-2048  
**Zaailing:** SW 07-1082

### Plant- en knoleigenschappen

**Rijptijd:** middenvroeg / 7  
**Kiemkleur:** rood / R  
**Bloemkleur:** licht paars / LP  
**Hoeveelheid bessen:** zeer veel / 4  
**Loof - ontwikkeling begin:** vrij snel / 7,5  
**Loof - ontwikkeling volledig:** goed / 8  
**Loof - stevigheid plant:** vrij stevig / 7  
**Schilkleur:** rood / R  
**Vleeskleur:** lichtgeel / 6  
**Schilhoedanigheid:** goed / 7  
**Knolvorm:** ovaal lang / OL  
**Regelmaat knolvorm:** regelmatig / 7  
**Knolzetting:** vrij hoog / 7  
**Knolgrootte:** vrij grof / 7  
**Regelmaat sortering:** vrij regelmatig / 6  
**Kiemrust:** vrij kort / 5,5

### Gevoeligheid en kwaliteit

**Doorwas:** redelijk gevoelig / 6  
**Blauwgevoeligheid:** weinig gevoelig / 7,5  
**Groeischeuren:** weinig gevoelig / 7  
**Roibeschatiging:** weinig gevoelig / 7  
**Ethyleen:** 5% tot 15% meer knollen / 6  
**Talent:** 25% meer knollen / 8  
**Onderwatergewicht:** 321  
**Drogestofgehalte:** 17,8%  
**Kooktype:** vrij vastkokend / AB  
**Grauwverkleuring (na koken):** redelijk gevoelig / 6  
**Rauwverkleuring:** - / -  
**Frietkwaliteit:** benedengemiddeld / 5,5  
**Drogestofverdeling:** - / -  
**Chipskwaliteit:** niet geschikt / 4  
**TGA-gehalte:** 10

# How to grow



[www.agricopotatoes.nl](http://www.agricopotatoes.nl)

## Teeltadvies <sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies + 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

## Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

## Planting distance

28/35 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)

## Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) vóór en na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken maar geeft zelden opbrengstderving.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

## Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

## Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor middellange tot lange bewaring.

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,  
say Agrico.

## Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: vatbaar / 5,5

Virus - Yntn (knol): weinig tot niet vatbaar / 8,5

Kringerigheid: vatbaar / 5,5

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4,5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6,5

Fusarium: vatbaar / 5,5

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: zeer vatbaar / 4,5

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 7,5

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): weinig vatbaar / 9

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): resistent / 9

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -