

Corsica.

Een middenlaat aardappelras voor chips met een goede opbrengst en een goed onderwatergewicht.



**Verwerkende
industrie**
Chips

- ▶ **Goede chipskwaliteit**
- ▶ **Goede bewaarbaarheid**
- ▶ **Middenlate rijptijd**



characteristics

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: LADY CLAIR x ARG 96-0865
Kwekersrecht: 31-12-2046
Zaailing: AR 05-1887

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 5,5
Kiemkleur: rood paars / RV
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: zeer veel / 4
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: benedengemiddeld / 5,5
Knolvorm: rond ovaal / RO
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: vrij hoog / 7
Knalgrootte: vrij grof / 7,5
Regelmaat sortering: regelmatig / 7
Kiemrust: vrij lang / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
Roibeschatiging: redelijk gevoelig / 6
Ethyleen: 15% tot 25% meer knollen / 7
Talent: 25% meer knollen / 8
Onderwatergewicht: 441
Drogestofgehalte: 23,7%
Kooktype: kruimig / C
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6
Rauwverkleuring: gevoelig / 5
Frietkwaliteit: gemiddeld / 6
Drogestofverdeling: gemiddeld / 6,5
Chipskwaliteit: uitstekend / 8
TGA-gehalte: 5,33

How to grow



www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies - 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling

Een korte warmtestoot of goed voorkiemen wordt aanbevolen. Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Eén keer afkiemen is optioneel.

Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) vóór en na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken maar geeft zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 9 °C. Geschikt voor lange bewaring.

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: weinig vatbaar / 6

Virus - Yntn (knol): vatbaar / 5,5

Kringerigheid: zeer vatbaar / 4

Phytophthora loof: vatbaar / 5,5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6,5

Fusarium: weinig vatbaar / 7

Schurft: weinig vatbaar / 7

Poederschurft: zeer vatbaar / 4,5

Zwarte spikkel: vatbaar / 5,5

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -