TEELTAANBEVELING

Corsica.

Een middenlaat aardappelras voor chips met een goede opbrengst en een goed onderwatergewicht.

- **Goede chipskwaliteit**
- **Goede bewaarbaarheid**
- **Middenlate rijptijd**

Verwerkende industrie
Chips



Karakteristieken

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: LADY CLAIR x ARG 96-0865
Kwekersrecht: 31-12-2046
Zaailing: AR 05-1887

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 5,5
Kiemkleur: rood paars / RV
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: zeer veel / 4
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: benedengemiddeld / 5,5
Knolvorm: rond ovaal / RO
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: vrij hoog / 7
Knolgrootte: vrij grof / 7,5
Regelmaat sortering: regelmatig / 7
Kiemrust: vrij lang / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
Rooibeschadiging: redelijk gevoelig / 6
Ethyleen: 15% tot 25% meer knollen / 7
Talent: 25% meer knollen / 8
Onderwatergewicht: 441
Drogestofgehalte: 23,7%
Kooktype: kruimig / C
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6
Rauwverkleuring: gevoelig / 5
Frietkwaliteit: gemiddeld / 6
Drogestofverdeling: gemiddeld / 6,5
Chipskwaliteit: uitstekend / 8
TGA-gehalte (mg/100 gr): 5,33 mg/100g

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

TEELTAANBEVELING

Teeltadvies

www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies [1]

Stikstof: standaard advies - 10%.
Fosfaat: standaard advies.
Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling

Een korte warmtestoot of goed voorkiemen wordt aanbevolen.Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting.Eén keer afkiemen is optioneel.

Plantafstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)
35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 9 °C. Geschikt voor lange bewaring.

[1] Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato, say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -
Virus - Yn: weinig vatbaar / 6
Virus - Yntn (knol): vatbaar / 5,5
Kringerigheid: zeer vatbaar / 4
Phytophthora loof: vatbaar / 5,5
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6,5
Fusarium: weinig vatbaar / 7
Schurft: weinig vatbaar / 7
Poederschurft: zeer vatbaar / 4,5
Zwarte spikkel: vatbaar / 5,5
Wratziekte F1 (D1): resistent / 10
Wratziekte F6 (O1): - / -
Wratziekte F18 (T1): - / -
Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A): resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C): - / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D): - / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E): - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord +31 (0)527 639911 info@agrico.nl agricopotatoes.nl