

# Diament.



Traditioneel

Een veelzijdig, middenlaat, hoogopbrengend aardappelras voor consumptie met een goede hitteresistentie en geschikt voor verwerking tot thuisfrites.

- ▶ **Goede bakkwaliteit**
- ▶ **Goede virusresistenties**
- ▶ **Geschikt voor een tweede teelt**



## characteristics

### Algemene kenmerken

Kweker: Precardi  
 Kruising: CARDINAL MUTANT  
 Kwekersrecht: Verlopen  
 Zaailing: -

### Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 6  
 Kiemkleur: rood paars / RV  
 Bloemkleur: paars / P  
 Hoeveelheid bessen: zeer veel / 4  
 Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7  
 Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8  
 Loof - stevigheid plant: stevig / 8  
 Schilkleur: geel / Y  
 Vleeskleur: lichtgeel / 6  
 Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6  
 Knolvorm: ovaal / O  
 Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6  
 Knolzetting: vrij hoog / 7  
 Knalgrootte: vrij grof / 7  
 Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6  
 Kiemrust: vrij kort / 5

### Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: weinig gevoelig / 7  
 Blauwgevoeligheid: gevoelig / 5  
 Groeischeuren: weinig tot niet gevoelig / 8  
 Rooibeschaaging: redelijk gevoelig / 6  
 Ethyleen: - / -  
 Talent: - / -  
 Onderwatergewicht: 420  
 Drogestofgehalte: 23%  
 Kooktype: vrij kruimig / B  
 Grauwverkleuring (na koken): zeer gevoelig / 4  
 Rauwverkleuring: - / -  
 Frietkwaliteit: goed / 7  
 Drogestofverdeling: - / -  
 Chipskwaliteit: gemiddeld / 6  
 TGA-gehalte: 12,9

# How to grow



[www.agricopotatoes.nl](http://www.agricopotatoes.nl)

## Teeltadvies <sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies + 5%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 20%.

## Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Eén keer afkiemen is optioneel.

## Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)

## Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) vóór en na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

## Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofddoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

## Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor levering direct vanuit het veld en voor korte bewaring.

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,  
say Agrico.

## Resistenties

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 6

Virus - Yn: weinig vatbaar / 7

Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6

Phytophthora loof: weinig vatbaar / 6

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7

Fusarium: vatbaar / 5

Schurft: zeer vatbaar / 4,5

Poederschurft: zeer vatbaar / 3

Zwarte spikkel: - / -

Wrastziekte F1 (D1): resistent / 10

Wrastziekte F6 (O1): matig vatbaar / 6

Wrastziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -