

Ditta.

Een veelzijdig, middenlaat aardappelras voor tafel- en saladesegment, geschikt voor gangbare en biologische teelt.



Biologisch



Retail
Vers
Salade

- ▶ **Uitstekende consumptie kwaliteit**
- ▶ **Goede bewaarbaarheid**
- ▶ **Brede resistenties**



characteristics

Algemene kenmerken

Kweker: Nieder Österreichische
Saatbaugenossenschaft
Kruising: BINTJE x QUARTA
Kwekersrecht: Verlopen
Zaailing: SW 80-0540

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 6
Kiemkleur: blauw paars / BV
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: zeer veel / 4
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolvorm: lang ovaal / LO
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: vrij hoog / 7
Knolgrootte: vrij grof / 7
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: vrij lang / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
Roibeschatting: gevoelig / 5,5
Ethyleen: - / -
Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7
Onderwatergewicht: 369
Drogestofgehalte: 20,2%
Kooktype: vastkokend / A
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6
Rauwverkleuring: zeer gevoelig / 4
Frietkwaliteit: benedengemiddeld / 5,5
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
TGA-gehalte: -

How to grow



www.agricopotatoes.com

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies - 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.500 planten/ha)

35/50 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) vóór en na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken maar geeft zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 7

Virus - Yn: weinig vatbaar / 7,5

Virus - Yntn (knol): vatbaar / 5

Kringerigheid: vatbaar / 5

Phytophthora loof: vatbaar / 5,5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: weinig vatbaar / 6,5

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 6

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -