TEELTAANBEVELING


Ditta.

Een veelzijdig, middenlaat aardappelras voor tafel- en saladesegment, geschikt voor gangbare en biologische teelt.

Biologisch

Retail
Vers
Salade

- **Uitstekende consumptie kwaliteit**
- **Goede bewaarbaarheid**
- **Brede resistenties**



Karakteristieken

Algemene kenmerken

Kweker: Nieder Österreichische Saatbaugenossenschaft
Kruising: BINTJE x QUARTA
Kwekersrecht: Verlopen
Zaailing: SW 80-0540

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 6
Kiemkleur: blauw paars / BV
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: zeer veel / 4
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolvorm: lang ovaal / LO
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: vrij hoog / 7
Knolgrootte: vrij grof / 7
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
Kiemrust: vrij lang / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
Rooibeschadiging: gevoelig / 5,5
Ethyleen: - / -
Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7
Onderwatergewicht: 369
Drogestofgehalte: 20,2%
Kooktype: vastkokend / A
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6
Rauwverkleuring: zeer gevoelig / 4
Frietkwaliteit: benedengemiddeld / 5,5
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
TGA-gehalte (mg/100 gr): -

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

AGRICO

TEELTAANBEVELING

Teeltadvies

www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies [1]

Stikstof: standaard advies - 10%.
Fosfaat: standaard advies.
Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot.Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 22 cm (60.500 planten/ha)
35/50 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

[1] Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato, say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 7
Virus - Yn: weinig vatbaar / 7,5
Virus - Yntn (knol): vatbaar / 5
Kringerigheid: vatbaar / 5
Phytophthora loof: vatbaar / 5,5
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7
Fusarium: weinig vatbaar / 6
Schurft: weinig vatbaar / 6
Poederschurft: weinig vatbaar / 6,5
Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 6
Wratziekte F1 (D1): resistent / 10
Wratziekte F6 (O1): - / -
Wratziekte F18 (T1): - / -
Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A): resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C): - / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D): - / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E): - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord +31 (0)527 639911 info@agrico.nl agricopotatoes.nl