

# Erika.

Een vroege, vastkokende aardappel voor tafel en salade met een goede schurftresistentie.



**Retail**  
Vers  
Salade

- ▶ **Mooie presentatie**
- ▶ **Hoog knolaantal**
- ▶ **Goede Y-virusresistenties**



## characteristics

### Algemene kenmerken

**Kweker:** Nieder Österreichische  
Saatbaugenossenschaft  
**Kruising:** MARABEL x AR 88-0156  
**Kwekersrecht:** 31-12-2040  
**Zaailing:** NO 98-0132

### Plant- en knoleigenschappen

**Rijptijd:** vroeg / 7,5  
**Kiemkleur:** blauw paars / BV  
**Bloemkleur:** wit / W  
**Hoeveelheid bessen:** zeer veel / 4  
**Loof - ontwikkeling begin:** vrij traag / 5,5  
**Loof - ontwikkeling volledig:** slecht / 5,5  
**Loof - stevigheid plant:** vrij stevig / 7  
**Schilkleur:** geel / Y  
**Vleeskleur:** lichtgeel / 6  
**Schilhoedanigheid:** uitstekend / 8  
**Knolvorm:** lang ovaal / LO  
**Regelmaat knolvorm:** regelmatig / 7  
**Knolzetting:** vrij hoog / 7  
**Knolgrootte:** vrij grof / 7  
**Regelmaat sortering:** regelmatig / 7  
**Kiemrust:** gemiddeld / 6,5

### Gevoeligheid en kwaliteit

**Doorwas:** redelijk gevoelig / 6,5  
**Blauwgevoeligheid:** redelijk gevoelig / 6  
**Groeischeuren:** redelijk gevoelig / 6  
**Roibeschatting:** weinig gevoelig / 7  
**Ethyleen:** - / -  
**Talent:** 15% tot 25% meer knollen / 7  
**Onderwatergewicht:** 337  
**Drogestofgehalte:** 18,6%  
**Kooktype:** vastkokend / A  
**Grauwverkleuring (na koken):** redelijk gevoelig / 6  
**Rauwverkleuring:** weinig gevoelig / 7  
**Frietkwaliteit:** niet geschikt / 5  
**Drogestofverdeling:** - / -  
**Chipskwaliteit:** niet geschikt / 4  
**TGA-gehalte:** 2,6

# How to grow



[www.agricopotatoes.com](http://www.agricopotatoes.com)

## Teeltadvies <sup>1</sup>

**Stikstof:** standaard advies + 20%. Bij voorkeur een hoge startgift en een eventuele tweede gift.

**Fosfaat:** standaard advies.

**Kalium:** standaard advies + 10%.

## Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

## Planting distance

30/50 mm: 23 cm (58.000 planten/ha)

## Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) vóór en na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken maar geeft zelden opbrengstderving.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

## Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofddoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

## Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,  
say Agrico.

## Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8,5

Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7

Kringerigheid: zeer vatbaar / 4

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 3,5

Phytophthora knol: zeer vatbaar / 4

Fusarium: vatbaar / 5

Schurft: weinig vatbaar / 7

Poederschurft: vatbaar / 5,5

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1): - / -

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -