TEELTAANBEVELING

# Erika.

Een vroege, vastkokende aardappel voor tafel en salade met een goede schurftresistentie.

- **Mooie presentatie**
- **Hoog knolaantal**
- **Goede Y-virusresistenties**

**Retail**
Vers
Salade



# Karakteristieken

## Algemene kenmerken

**Kweker:** Nieder Österreichische Saatbaugenossenschaft
**Kruising:** MARABEL x AR 88-0156
**Kwekersrecht:** 31-12-2040
**Zaailing:** NO 98-0132

## Plant- en knoleigenschappen

**Rijptijd:** vroeg / 7,5
**Kiemkleur:** blauw paars / BV
**Bloemkleur:** wit / W
**Hoeveelheid bessen:** zeer veel / 4
**Loof - ontwikkeling begin:** vrij traag / 5,5
**Loof - ontwikkeling volledig:** slecht / 5,5
**Loof - stevigheid plant:** vrij stevig / 7
**Schilkleur:** geel / Y
**Vleeskleur:** lichtgeel / 6
**Schilhoedanigheid:** uitstekend / 8
**Knolvorm:** lang ovaal / LO
**Regelmaat knolvorm:** regelmatig / 7
**Knolzetting:** vrij hoog / 7
**Knolgrootte:** vrij grof / 7
**Regelmaat sortering:** regelmatig / 7
**Kiemrust:** gemiddeld / 6,5

## Gevoeligheid en kwaliteit

**Doorwas:** redelijk gevoelig / 6,5
**Blauwgevoeligheid:** redelijk gevoelig / 6
**Groeischeuren:** redelijk gevoelig / 6
**Rooibeschadiging:** weinig gevoelig / 7
**Ethyleen:** - / -
**Talent:** 15% tot 25% meer knollen / 7
**Mutantvorming:** Bij het gebruik van Talent kan mutantvorming optreden. / Use of carvone oil can provoke mutations.
**Onderwatergewicht:** 337
**Drogestofgehalte:** 18,6%
**Kooktype:** vastkokend / A
**Grauwverkleuring (na koken):** redelijk gevoelig / 6
**Rauwverkleuring:** weinig gevoelig / 7
**Frietkwaliteit:** niet geschikt / 5
**Drogestofverdeling:** - / -
**Chipskwaliteit:** niet geschikt / 4
**TGA-gehalte (mg/100 gr):** 2,6 mg/100g

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

TEELTAANBEVELING

# Teeltadvies

www.agricopotatoes.nl

## Teeltadvies [1]

**Stikstof:** standaard advies + 20%.Bij voorkeur een hoge startgift en een eventuele tweede gift.

**Fosfaat:** standaard advies.

**Kalium:** standaard advies + 10%.

## Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting.Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

## Plantafstand

30/50 mm: 23 cm (58.000 planten/ha)

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

## Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

## Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

[1] Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato, say Agrico.

## Resistenties

**Virus - Bladrol:** - / -

**Virus - Yn:** weinig tot niet vatbaar / 8,5

**Virus - Yntn (knol):** weinig vatbaar / 7

**Kringerigheid:** zeer vatbaar / 4

**Phytophthora loof:** zeer vatbaar / 3,5

**Phytophthora knol:** zeer vatbaar / 4

**Fusarium:** vatbaar / 5

**Schurft:** weinig vatbaar / 7

**Poederschurft:** vatbaar / 5,5

**Zwarte spikkel:** weinig vatbaar / 7

**Wratziekte F1 (D1):** - / -

**Wratziekte F6 (O1):** - / -

**Wratziekte F18 (T1):** - / -

**Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A):** resistent / 9

**Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C):** - / -

**Aardappelmoeheid Pa 2 (D):** - / -

**Aardappelmoeheid Pa 3 (E):** - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord +31 (0)527 639911 info@agrico.nl agricopotatoes.nl