

Esmee.

Een middenvroeg aardappelras voor consumptie met een rode schil, een goede hitteresistentie en een uitstekende opbrengst.




Retail
Vers



Traditioneel

- ▶ **Mooie presentatie**
- ▶ **Grove knollen**
- ▶ **Brede virusresistenties**



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: LAURA x RODEO
Kwekersrecht: 31-12-2043
Zaailing: AR 01-0410

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenvroeg / 6,5
Kiemkleur: rood paars / RV
Bloemkleur: licht paars / LP
Hoeveelheid bessen: zeer veel / 4
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: vrij goed / 7,5
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7
Schilkleur: rood / R
Vleeskleur: geel / 7
Schilhoedanigheid: uitstekend / 8
Knolvorm: ovaal lang / OL
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting: gemiddeld / 6
Knalgrootte: grof / 8
Regelmaat sortering: regelmatig / 7
Kiemrust: gemiddeld / 6

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6
Roibeschatting: redelijk gevoelig / 6,5
Ethyleen: 5% minder tot 5% meer knollen / 5
Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7
Onderwatergewicht: 326
Drogestofgehalte: 18%
Kooktype: vrij vastkokend / AB
Grauwverkleuring (na koken): gevoelig / 5,5
Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6
Frietkwaliteit: gemiddeld / 6
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
TGA-gehalte: 8,2

TEELTADVIES



www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies + 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik geen Metribuzin (Sencor). Dit geeft een ernstige loofreactie en opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7

Kringerigheid: zeer vatbaar / 4

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4,5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7

Fusarium: weinig vatbaar / 7

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: weinig vatbaar / 6,5

Zwarte spikkel: vatbaar / 5,5

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): - / -

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -