


Evolution.



Traditioneel

Een middenvroeg aardappelras voor consumptie met een mooie donkerrode schil en vroeg een hoge opbrengst.

- ▶ **Uniforme sortering**
- ▶ **Grote knollen**
- ▶ **Vroege oogst**
- ▶ **Goede resistentie tegen schurft**
- ▶ **Sterk loof**



characteristics

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
 Kruising: AR 94-0807 x AMOROSA
 Kwekersrecht: 31-12-2042
 Zaailing: AR 99-0522

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenvroeg / 6,5
 Kiemkleur: groen rood / GR
 Bloemkleur: licht paars / LP
 Hoeveelheid bessen: bovengemiddeld / 5
 Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
 Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
 Loof - stevigheid plant: gemiddeld / 6,5
 Schilkleur: rood / R
 Vleeskleur: lichtgeel / 6
 Schilhoedanigheid: goed / 7
 Knolvorm: ovaal lang / OL
 Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6
 Knolzetting: vrij hoog / 7
 Knalgrootte: grof / 8
 Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6,5
 Kiemrust: kort / 4

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
 Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7
 Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6
 Rooibeschatting: weinig gevoelig / 7
 Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6
 Talent: 5% minder knollen / 4
 Onderwatergewicht: 343
 Drogestofgehalte: 18,9%
 Kooktype: vrij kruimig / B
 Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6
 Rauwverkleuring: - / -
 Frietkwaliteit: niet geschikt / 4,5
 Drogestofverdeling: - / -
 Chipskwaliteit: niet geschikt / 4
 TGA-gehalte: 8

How to grow



www.agricopotatoes.com

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies - 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) vóór en na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken maar geeft zelden opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor levering direct vanuit het veld en voor korte bewaring.

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: vatbaar / 5,5

Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7

Kringerigheid: vatbaar / 5

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: weinig vatbaar / 6,5

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 6

Wratziekte F1 (D1): licht vatbaar / 8

Wratziekte F6 (O1): resistent / 10

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): weinig vatbaar / 6

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): partieel resistent / 7

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): weinig vatbaar / 5