

Fontane.

Een middenlaat, hoogopbrengend aardappelras voor de frites- en verwerkende industrie.



Verwerkende industrie

Frites
Chips
Vlokken

- ▶ **Grove knollen**
- ▶ **Hoog onderwatergewicht**
- ▶ **Geschikt voor diverse grondsoorten**



characteristics

Algemene kenmerken

Kweker: Lantmännen Seed B.V.
Kruising: AGRIA x AR 76-034-03
Kwekersrecht: 31-12-2028
Zaailing: SW 87-1140

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 5,5
Kiemkleur: blauw paars / BV
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: bovengemiddeld / 5
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
Loof - ontwikkeling volledig: gemiddeld / 7
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: matig / 5
Knolvorm: ovaal / O
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting: vrij hoog / 7
Knolgrootte: vrij grof / 7
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6
Kiemrust: vrij kort / 5,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6
Roibeschatiging: redelijk gevoelig / 6
Ethyleen: 15% tot 25% meer knollen / 7
Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7
Onderwatergewicht: 430
Drogestofgehalte: 23,2%
Kooktype: kruimig / BC
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5
Rauwverkleuring: gevoelig / 5,5
Frietkwaliteit: zeer goed / 7,5
Drogestofverdeling: gemiddeld / 6,5
Chipskwaliteit: gemiddeld / 6
TGA-gehalte: 6,1

How to grow



www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies + 30%. Het is mogelijk om organische mest te gebruiken.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Meer dan twee keer afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Planting distance

28/35 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

35/55 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)

50/55 mm: 40 cm (33.000 planten/ha)

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) vóór en na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor lange bewaring.



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 6

Virus - Yn: vatbaar / 5,5

Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6,5

Phytophthora loof: vatbaar / 5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6,5

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: weinig vatbaar / 6

Zwarte spikkel: - / -

Wratziekte F1 (D1): matig vatbaar / 6

Wratziekte F6 (O1): licht vatbaar / 8

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -