

Jacky.

Een middenvroeg, fijnvallend aardappelas voor consumptie met een goede opbrengst en Phytophthora-tolerantie in loof en knol.

- ▶ **Hoge knolzetting**
- ▶ **Phytophthoraresistent**
- ▶ **Prachtige krielaardappelen**



Biologisch



Verwerkende industrie
Koelvers



Retail
Krielaardappelen



KARAKTERISTIEKEN

Algemene kenmerken

Kweker: Lantmännen Seed B.V.
Kruising: ANOUK x ATHLETE
Kwekersrecht: 31-12-2049
Zaailing: SW 09-0557

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenvroeg / 6,5
Kiemkleur: groen rood / GR
Bloemkleur: licht paars / LP
Hoeveelheid bessen: benedengemiddeld / 6,5
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5
Loof - ontwikkeling volledig: vrij goed / 7,5
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: bovengemiddeld / 6,5
Knolvorm: rond ovaal / RO
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting: hoog / 9
Knalgrootte: gemiddeld / 6,5
Regelmaat sortering: vrij regelmatig / 6
Kiemrust: vrij kort / 5,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5
Roibeschatting: weinig tot niet gevoelig / 8
Ethyleen: 15% tot 25% meer knollen / 7
Talent: 5% minder knollen / 4
Onderwatergewicht: 368
Drogestofgehalte: 20,1%
Kooktype: vrij kruimig / B
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5
Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6
Frietkwaliteit: benedengemiddeld / 5,5
Drogestofverdeling: goed / 7
Chipskwaliteit: niet geschikt / 5
TGA-gehalte: 14,05

TEELTADVIES



www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 20 cm (67.000 planten/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) vóór en na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Ondanks de phytophthora resistentie, blijf alert voor infecties.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: zeer vatbaar / 4,5

Virus - Yntn (knol): weinig tot niet vatbaar / 8

Kringrigheid: weinig vatbaar / 6

Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 9

Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 9

Fusarium: vatbaar / 5,5

Schurft: vatbaar / 5,5

Poederschurft: zeer vatbaar / 2

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 6

Wratziekte F1 (D1): - / -

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -