

# Jolene.

Een middenlaat aardappelras voor consumptie met een mooie huid en geschikt voor thuisfrites.




**Retail**  
Vers



**Traditioneel**

- ▶ **Veelzijdig ras**
- ▶ **Goede schilhoedanigheid**
- ▶ **Uniforme knollen**
- ▶ **Goede resistentie tegen virussen**



## characteristics

### Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.  
Kruising: SAGITTA x AR 03-1491  
Kwekersrecht: 31-12-2050  
Zaailing: AR 09-2556

### Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 6  
Kiemkleur: rood / R  
Bloemkleur: wit / W  
Hoeveelheid bessen: benedengemiddeld / 7  
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7,5  
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8  
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5  
Schilkleur: geel / Y  
Vleeskleur: lichtgeel / 6  
Schilhoedanigheid: goed / 7  
Knolvorm: ovaal lang / OL  
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7  
Knolzetting: vrij hoog / 7  
Knalgrootte: vrij grof / 7,5  
Regelmaat sortering: regelmatig / 7  
Kiemrust: gemiddeld / 6

### Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: weinig gevoelig / 7  
Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7  
Groeischeuren: weinig gevoelig / 7  
Roibeschatting: redelijk gevoelig / 6  
Ethyleen: 15% tot 25% meer knollen / 7  
Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7  
Onderwatergewicht: 389  
Drogestofgehalte: 21,1%  
Kooktype: vrij kruimig / B  
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5  
Rauwverkleuring: weinig gevoelig / 7  
Frietkwaliteit: goed / 7  
Drogestofverdeling: - / -  
Chipskwaliteit: niet geschikt / 5  
TGA-gehalte: 6,9

# How to grow



[www.agricopotatoes.nl](http://www.agricopotatoes.nl)

## Teeltadvies <sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

## Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

## Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.500 planten/ha)

35/55 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

## Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) vóór en na opkomst kan enige reactie in het loof veroorzaken en kan enige opbrengstderving geven.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

## Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

## Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,  
say Agrico.

## Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yntn (knol): weinig tot niet vatbaar / 8

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6

Phytophthora loof: zeer vatbaar / 4

Phytophthora knol: vatbaar / 5

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: weinig vatbaar / 6,5

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 7,5

Wratziekte F1 (D1): - / -

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): - / -

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -