

Kuras.

Een laat ras voor de zetmeelteelt met resistentie tegen aardappelmoeheid en een zeer goede zetmeelopbrengst.



**Verwerkende
industrie**
Zetmeel

- ▶ **Witte vleeskleur**
- ▶ **Goede bewaarbaarheid**
- ▶ **Goede resistentie tegen virus en Phytophthora**



Karakteristieken

Algemene kenmerken

Kweker: G. Kuper
Kruising: PG 285 x AR 69-0491
Kwekersrecht: Verlopen
Zaailing: KU 80-1271

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: laat / 4
Kiemkleur: blauw paars / BV
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: zeer veel / 4
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: vrij goed / 7,5
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: wit / 4,5
Schilhoedanigheid: matig / 5
Knolvorm: rond ovaal / RO
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6
Knolzetting: gemiddeld / 6
Knolgrootte: vrij grof / 7,5
Regelmaat sortering: regelmatig / 7
Kiemrust: vrij kort / 5,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
Rooibeschatiging: gevoelig / 5,5
Ethyleen: - / -
Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7
Mutantvorming: Bij het gebruik van Talent kan mutantvorming optreden. / Use of carvone oil can provoke mutations.
Onderwatergewicht: 490
Drogestofgehalte: 25,9%
Kooktype: kruimig / C
Grauwverkleuring (na koken): zeer gevoelig / 4,5
Rauwverkleuring: - / -
Frietkwaliteit: benedengemiddeld / 5,5
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: niet geschikt / 4,5
TGA-gehalte (mg/100 gr): 33,8 mg/100g
S_Harvestability: - / -

Teeltadvies



www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies + 5%. Het is mogelijk om organische mest te gebruiken.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Plantafstand

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema wordt geadviseerd.

Oogst

Wacht tenminste twee weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 7

Virus - Yn: weinig tot niet vatbaar / 8

Virus - Yntn (knol): weinig tot niet vatbaar / 9

Kringerigheid: weinig vatbaar / 6,5

Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 8

Phytophthora knol: weinig tot niet vatbaar / 8

Fusarium: weinig vatbaar / 7

Schurft: vatbaar / 5,5

Poederschurft: weinig vatbaar / 6,5

Zwarte spikkel: - / -

R_PCN Tolerance: - / -

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): matig vatbaar / 5

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): resistent / 9

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -