

# Kuroda.



Traditioneel

Een middenlaat, roodschillig aardappelras voor consumptie met een uitstekende hitteresistentie en een goede opbrengst.

- ▶ Grove knollen
- ▶ Goede bewaarbaarheid
- ▶ Brede wrastziekte resistentie



## characteristics

### Algemene kenmerken

Kweker: G. Kuik  
 Kruising: AR 76-199-03 x KO 80-1407  
 Kwekersrecht: 31-12-2025  
 Zaailing: KK 83-0216

### Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 6  
 Kiemkleur: blauw paars / BV  
 Bloemkleur: paars / P  
 Hoeveelheid bessen: gemiddeld / 6  
 Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7  
 Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8  
 Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5  
 Schilkleur: rood / R  
 Vleeskleur: lichtgeel / 6  
 Schilhoedanigheid: goed / 7  
 Knolvorm: ovaal / O  
 Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5  
 Knolzetting: vrij laag / 5  
 Knalgrootte: grof / 8  
 Regelmaat sortering: regelmatig / 7  
 Kiemrust: lang / 8

### Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: weinig gevoelig / 7  
 Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6  
 Groeischeuren: weinig gevoelig / 7  
 Rooibeschatting: gevoelig / 5  
 Ethyleen: 15% tot 25% meer knollen / 7  
 Talent: 5% tot 15% meer knollen / 6  
 Onderwatergewicht: 426  
 Drogestofgehalte: 23%  
 Kooktype: kruimig / BC  
 Grauwverkleuring (na koken): zeer gevoelig / 4,5  
 Rauwverkleuring: - / -  
 Frietkwaliteit: benedengemiddeld / 5,5  
 Drogestofverdeling: - / -  
 Chipskwaliteit: niet geschikt / 5  
 TGA-gehalte: -

# How to grow



[www.agricopotatoes.nl](http://www.agricopotatoes.nl)

## Teeltadvies <sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies + 10%.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 20%.

## Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting. Eén keer afkiemen is optioneel.

## Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.500 planten/ha)

35/55 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

## Onkruiden

Gebruik geen Metribuzin (Sencor). Dit geeft een ernstige loofreactie en opbrengstderving.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

## Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofddoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

## Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor lange bewaring.

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,  
say Agrico.

## Resistenties

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 6

Virus - Yn: weinig vatbaar / 7

Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7

Kringerigheid: weinig vatbaar / 7

Phytophthora loof: vatbaar / 5

Phytophthora knol: vatbaar / 5

Fusarium: weinig tot niet vatbaar / 8

Schurft: vatbaar / 5

Poederschurft: zeer vatbaar / 2

Zwarte spikkel: - / -

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): weinig vatbaar / 9

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -