TEELTAANBEVELING

Kuroda.

Een middenlaat, roodschillig aardappelras voor consumptie met een uitstekende hitteresistentie en een goede opbrengst.

- **Grove knollen**
- **Goede bewaarbaarheid**
- **Brede wratziekte resistentie**

Traditioneel



Karakteristieken

Algemene kenmerken

Kweker: G. Kuik
Kruising: AR 76-199-03 x KO 80-1407
Kwekersrecht: Verlopen
Zaailing: KK 83-0216

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 6
Kiemkleur: blauw paars / BV
Bloemkleur: paars / P
Hoeveelheid bessen: gemiddeld / 6
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5
Schilkleur: rood / R
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolvorm: ovaal / O
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting: vrij laag / 5
Knolgrootte: grof / 8
Regelmaat sortering: regelmatig / 7
Kiemrust: lang / 8

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6
Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
Rooibeschadiging: gevoelig / 5
Ethyleen: 15% tot 25% meer knollen / 7
Talent: 5% tot 15% meer knollen / 6
Onderwatergewicht: 426
Drogestofgehalte: 23%
Kooktype: kruimig / BC
Grauwverkleuring (na koken): zeer gevoelig / 4,5
Rauwverkleuring: - / -
Frietkwaliteit: benedengemiddeld / 5,5
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: niet geschikt / 5
TGA-gehalte (mg/100 gr): -

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

TEELTAANBEVELING

Teeltadvies

www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies [1]

Stikstof: standaard advies + 10%.
Fosfaat: standaard advies.
Kalium: standaard advies + 20%.

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting.Eén keer afkiemen is optioneel.

Plantafstand

28/35 mm: 22 cm (60.500 planten/ha)
35/55 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor lange bewaring.

[1] Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato, say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 6
Virus - Yn: weinig vatbaar / 7
Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7
Kringerigheid: weinig vatbaar / 7
Phytophthora loof: vatbaar / 5
Phytophthora knol: vatbaar / 5
Fusarium: weinig tot niet vatbaar / 8
Schurft: vatbaar / 5

Poederschurft: zeer vatbaar / 2
Zwarte spikkel: - / -
Wratziekte F1 (D1): resistent / 10
Wratziekte F6 (O1): weinig vatbaar / 9
Wratziekte F18 (T1): - / -
Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A): resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C): - / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D): - / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E): - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord +31 (0)527 639911 info@agrico.nl agricopotatoes.nl