

Levante.

Een middenlaat, hoogopbrengend aardappelras voor consumptie met een mooie, gele huid en Phytophthora-tolerantie in loof en knol.



Biologisch




Retail
Vers



Traditioneel

- ▶ **Phytophthoraresistent**
- ▶ **Goede schilhoedanigheid**
- ▶ **Sterke plant**
- ▶ **Breed resistent**
- ▶ **Hoge knolzetting**
- ▶ **Hoge opbrengst**



characteristics

Algemene kenmerken

Kweker: Agrico Research B.V.
Kruising: AR 01-3218 x ALMERA
Kwekersrecht: 31-12-2048
Zaailing: AR 07-3009

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 5,5
Kiemkleur: groen rood / GR
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: bovengemiddeld / 5,5
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: lichtgeel / 6
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolvorm: lang ovaal / LO
Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting: hoog / 8
Knolgrootte: vrij grof / 7
Regelmaat sortering: regelmatig / 7
Kiemrust: gemiddeld / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6,5
Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
Roibeschatting: redelijk gevoelig / 6
Ethyleen: 5% minder knollen / 4
Talent: 5% tot 15% meer knollen / 6
Onderwatergewicht: 365
Drogestofgehalte: 19,9%
Kooktype: vrij kruimig / B
Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7
Rauwverkleuring: gevoelig / 5,5
Frietkwaliteit: benedengemiddeld / 5,5
Drogestofverdeling: - / -
Chipskwaliteit: niet geschikt / 4,5
TGA-gehalte: 4,73

How to grow



www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies. Bij voorkeur een gedeelde gift en de tweede gift kort na knolzetting.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies.

Pootgoedbehandeling

Plant bij voorkeur als de grond iets is opgewarmd, aangezien dit ras een wat trage beginontwikkeling heeft. Afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering. Een korte warmtestoot of goed voorkiemen wordt aanbevolen.

Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.500 planten/ha)

35/55 mm: 27 cm (49.500 planten/ha)

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) voor en na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Ondanks de phytophthora resistentie, blijf alert voor infecties.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 4 °C. Geschikt voor middellange tot lange bewaring.



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: weinig vatbaar / 6

Virus - Yntn (knol): weinig tot niet vatbaar / 8,5

Kringrigheid: zeer vatbaar / 4,5

Phytophthora loof: weinig tot niet vatbaar / 8,5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7,5

Fusarium: weinig vatbaar / 6

Schurft: vatbaar / 5

Poederschurft: weinig vatbaar / 6,5

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 7,5

Wratziekte F1 (D1): - / -

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): - / -

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -