

Lugano.

Een middenlaat, geelvezig aardappelras voor verwerking met brede aardappelmoetheid resistenties.



**Verwerkende
industrie**
Frites



Traditioneel

- ▶ **Grote knollen**
- ▶ **Breed resistent**
- ▶ **Goede bewaarbaarheid**
- ▶ **Uitstekende friteskwaliteit**
- ▶ **Goede bewaarbaarheid**



characteristics

Algemene kenmerken

Kweker: F.J. Vos

Kruising: AR 00-2211 x AR 99-0669

Kwekersrecht: 31-12-2048

Zaailing: VO 07-0289

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: middenlaat / 5,5

Kiemkleur: rood / R

Bloemkleur: wit / W

Hoeveelheid bessen: benedengemiddeld / 7

Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7

Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8

Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7,5

Schilkleur: geel / Y

Vleeskleur: lichtgeel / 6,5

Schilhoedanigheid: gemiddeld / 6

Knolvorm: ovaal lang / OL

Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6

Knolzetting: vrij laag / 5

Knalgrootte: grof / 8

Regelmaat sortering: regelmatig / 7

Kiemrust: lang / 8

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6

Blauwgevoeligheid: redelijk gevoelig / 6

Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6,5

Roibeschatiging: zeer gevoelig / 4,5

Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6

Talent: 25% meer knollen / 8

Onderwatergewicht: 394

Drogestofgehalte: 21,4%

Kooktype: vrij kruimig / B

Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6,5

Rauwverkleuring: redelijk gevoelig / 6

Frietkwaliteit: goed / 7

Drogestofverdeling: goed / 7,5

Chipskwaliteit: benedengemiddeld / 5,5

TGA-gehalte: 6,4

How to grow



www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 20%.

Pootgoedbehandeling

Kan direct uit de koelcel geplant worden, bij voorkeur na een korte warmtestoot. Meer dan twee keer afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Planting distance

28/35 mm: 22 cm (60.000 planten/ha)

35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)

50/55 mm: 36 cm (37.000 planten/ha)

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse

Onkruiden

Een standaard dosering Metribuzin (Sencor) vóór en na opkomst geeft geen loof reactie of opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema wordt geadviseerd.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor lange bewaring.



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: vatbaar / 5,5

Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7,5

Kringerigheid: vatbaar / 5,5

Phytophthora loof: vatbaar / 5

Phytophthora knol: vatbaar / 5,5

Fusarium: weinig vatbaar / 6,5

Schurft: vatbaar / 5,5

Poederschurft: weinig vatbaar / 7,5

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 6

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): weinig vatbaar / 9

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): resistent / 9

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): resistent / 9

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): resistent / 9