

Manitou.

Een laat, roodschillig aardappelras voor consumptie met een goede schil en een hoge opbrengst.



Retail
Vers



Traditioneel

- ▶ **Grove knollen**
- ▶ **Goede droogtetolerantie**
- ▶ **Brede aardappelmoetheid resistenties**



characteristics

Algemene kenmerken

Kweker: Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.
 Kruising: LAURA x MARANCA
 Kwekersrecht: 31-12-2037
 Zaailing: MA 96-0419

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: laat / 5
 Kiemkleur: rood paars / RV
 Bloemkleur: paars / P
 Hoeveelheid bessen: bovengemiddeld / 5
 Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
 Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
 Loof - stevigheid plant: vrij stevig / 7
 Schilkleur: rood / R
 Vleeskleur: lichtgeel / 6
 Schilhoedanigheid: goed / 7
 Knolvorm: lang ovaal / LO
 Regelmaat knolvorm: vrij regelmatig / 6,5
 Knolzetting: vrij hoog / 7
 Knalgrootte: grof / 8
 Regelmaat sortering: regelmatig / 7
 Kiemrust: vrij kort / 5,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6,5
 Blauwgevoeligheid: weinig gevoelig / 7,5
 Groeischeuren: redelijk gevoelig / 6
 Rooibeschatiging: gevoelig / 5,5
 Ethyleen: 15% tot 25% meer knollen / 7
 Talent: 5% minder knollen / 4
 Onderwatergewicht: 351
 Drogestofgehalte: 19,4%
 Kooktype: vrij kruimig / B
 Grauwverkleuring (na koken): weinig gevoelig / 7
 Rauwverkleuring: - / -
 Frietkwaliteit: benedengemiddeld / 5,5
 Drogestofverdeling: - / -
 Chipskwaliteit: niet geschikt / 4,5
 TGA-gehalte: 3,4

How to grow



www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies ¹

Stikstof: standaard advies.
Fosfaat: standaard advies.
Kalium: standaard advies + 10%.

Pootgoedbehandeling

Meer dan eens afkiemen kan een negatief effect hebben op de opbrengst en uniformiteit van de sortering.

Planting distance

28/35 mm: 25 cm (54.000 planten/ha)
35/55 mm: 30 cm (45.000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik geen Metribuzin (Sencor). Dit geeft een ernstige loofreactie en opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema is noodzakelijk.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofddoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschatiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Geschikt voor middellange bewaring.

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato,
say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: - / -

Virus - Yn: weinig vatbaar / 6,5

Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7

Kringerigheid: weinig vatbaar / 7

Phytophthora loof: vatbaar / 5

Phytophthora knol: weinig vatbaar / 6

Fusarium: weinig vatbaar / 7

Schurft: weinig vatbaar / 6

Poederschurft: weinig vatbaar / 6

Zwarte spikkel: weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1): resistent / 10

Wratziekte F6 (O1): - / -

Wratziekte F18 (T1): - / -

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A): resistent / 9

Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C): resistent / 9

Aardappelmoetheid Pa 2 (D): - / -

Aardappelmoetheid Pa 3 (E): - / -