TEELTAANBEVELING

Markies.

Een laat, hoogopbrengend aardappelras voor verwerking, geschikt voor frites, fastfoodindustrie, chips en verse consumptie.

- **Uitstekende frietkwaliteit**
- **Goed onderwatergewicht**
- **Geschikt voor lange bewaring**

Verwerkende industrie
Frites
Chips

Traditioneel



Karakteristieken

Algemene kenmerken

Kweker: Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.
Kruising: FIANNA x AGRIA
Kwekersrecht: 31-12-2029
Zaailing: MA 85-0698

Plant- en knoleigenschappen

Rijptijd: laat / 4
Kiemkleur: blauw paars / BV
Bloemkleur: wit / W
Hoeveelheid bessen: benedengemiddeld / 6,5
Loof - ontwikkeling begin: vrij snel / 7
Loof - ontwikkeling volledig: goed / 8
Loof - stevigheid plant: stevig / 8
Schilkleur: geel / Y
Vleeskleur: lichtgeel / 6,5
Schilhoedanigheid: goed / 7
Knolvorm: ovaal lang / OL
Regelmaat knolvorm: regelmatig / 7
Knolzetting: gemiddeld / 6
Knolgrootte: vrij grof / 7,5
Regelmaat sortering: regelmatig / 7
Kiemrust: gemiddeld / 6,5

Gevoeligheid en kwaliteit

Doorwas: redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid: weinig tot niet gevoelig / 8
Groeischeuren: weinig gevoelig / 7
Rooibeschadiging: gevoelig / 5
Ethyleen: 5% tot 15% meer knollen / 6
Talent: 15% tot 25% meer knollen / 7
Mutantvorming: Bij het gebruik van Talent kan mutantvorming optreden. / Use of carvone oil can provoke mutations.
Onderwatergewicht: 427
Drogestofgehalte: 22,8%
Kooktype: kruimig / BC
Grauwverkleuring (na koken): redelijk gevoelig / 6
Rauwverkleuring: weinig gevoelig / 7
Frietkwaliteit: uitstekend / 8
Drogestofverdeling: goed / 7,5
Chipskwaliteit: goed / 7
TGA-gehalte (mg/100 gr): 3,4 mg/100g

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

AGRICO

TEELTAANBEVELING

Teeltadvies

www.agricopotatoes.nl

Teeltadvies [1]

Stikstof: standaard advies - 10%.Bij voorkeur opdelen in 3 giften. De tweede gift kort na knolzetting.

Fosfaat: standaard advies.

Kalium: standaard advies + 10%.

Pootgoedbehandeling

Goed voorkiemen na het verwijderen van de topspruit kan een positief resultaat geven op de knolzetting.Eén keer afkiemen is optioneel.

Plantafstand

28/35 mm: 27 cm (50.000 planten/ha)
35/55 mm: 33 cm (40.000 planten/ha)
50/55 mm: 40 cm (33.000 planten/ha)

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema wordt geadviseerd.

Oogst

Wacht tenminste drie weken na loofdoding, vanwege de gevoeligheid voor rooibeschadiging en/of stootblauw.

Bewaartemperatuur - Bewaarperiode

Geadviseerde bewaartemperatuur is 5 °C. Voor verwerkingsdoeleinden niet kouder bewaren dan 7 °C. Geschikt voor lange bewaring.

[1] Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse



Say potato, say Agrico.

Resistenties

Virus - Bladrol: weinig vatbaar / 7
Virus - Yn: weinig vatbaar / 7,5
Virus - Yntn (knol): weinig vatbaar / 7
Kringerigheid: zeer vatbaar / 4
Phytophthora loof: weinig vatbaar / 6,5
Phytophthora knol: weinig vatbaar / 7
Fusarium: weinig tot niet vatbaar / 8
Schurft: vatbaar / 5

Poederschurft: zeer vatbaar / 3,5
Zwarte spikkel: - / -
Wratziekte F1 (D1): - / -
Wratziekte F6 (O1): matig vatbaar / 5
Wratziekte F18 (T1): - / -
Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A): resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C): - / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D): - / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E): - / -

Agrico • Duit 15 • 8305 BB Emmeloord +31 (0)527 639911 info@agrico.nl agricopotatoes.nl